

Kirschn. et Step. in Taxon 46: 95. 1997.

瘦果有喙，红色至深砖红色或橙黄色或有时淡褐色，果上端常逐渐收缩成圆锥形或圆锥至圆柱形喙基，喙基长。外层总苞片常具宽的膜质边缘。舌状花黄色，柱头亮黄色。

本组我国有 2 种。

组模式种：小花蒲公英 *T. parvulum* DC.

1. 外层总苞片具窄膜质边缘，喙长 3—4 毫米 16. 丽江蒲公英 *T. dasypodum* V. Soest

1. 外层总苞片具宽膜质边缘，喙长 4—6 毫米 17. 小花蒲公英 *T. parvulum* DC.

16. 丽江蒲公英 (新拟) 图版 4: 1—4


Taraxacum dasypodum V. Soest in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 2 (10): 265. 1961.

多年生草本。根颈部有残叶柄，密被白色长蛛丝状柔毛。叶倒披针形，长 7 厘米，宽 1.8 厘米，羽状深裂，每侧裂片 2—3 片，顶端裂片常较大，戟形，先端略钝或全缘，侧裂片短，长约 5 毫米，三角形，裂片先端略尖，全缘，近无毛。花葶 2 至 3 个，略短于叶，高 5—6 厘米，被蛛丝状柔毛；头状花序直径 15—20 毫米；总苞长 10 毫米，淡绿色；外层总苞片卵形或卵状至披针形，长 3—5 毫米，宽约 2 毫米，具不显著的白色膜质边缘，先端增厚或有小角；内层总苞片较宽，可达 2—2.5 毫米，披针形或条状披针形，有略窄的淡色边缘，先端多少紫色，增厚；舌状花黄色，花柱和柱头黄色。瘦果淡麦秆黄色，长约 5 毫米，上部仅具数枚稀疏的小刺，其余光滑，顶端逐渐收缩为长 1 毫米的圆锥形喙基，喙长 3—4 毫米；冠毛白色，长 5 毫米。

产云南西部 (丽江、德钦、中甸、景东)。生于海拔 1900—3200 米干山坡草地上。模式标本采自云南丽江。

17. 小花蒲公英 (新拟) 图版 3: 1—5

Taraxacum parvulum (Wall.) DC. Prodr. 7 (1): 148. 1838; Kirschn. in Edinb. J. Bot. 53 (2): 219. 1996. — *Leontodon parvulum* Wall., Numer. List. ['Catal.'], p. 112, no. 3247/357 (1831), ['Kamaon RB'] nom. inval. — *Taraxacum dissectum* auct. non Ledeb.: Hand.-Mazz. Monogr. Tarax. 48. 1907. p. p.; Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 3: 204. 1935; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 22: 652. 1969. p. p. — *T. himalaicum* V. Soest in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 2 (10): 267. 1961. et in Wentia 10: 38. 1963; Kitam. et Gould. in Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 46. 1982. — *T. bhutanicum* V. Soest l. c. 2 (10): 263. 1961. — *T. staticifolium* V. Soest l. c. 2 (10): 272. 1961. — *T. kawaguchii* Kitam. in Act. Phytotax. Geobot. 15: 77. f. 13. 1953. — *T. bicolor* auct. non DC.: 西藏植物志 4: 937. 1985. — *T. wutaishanense* Kitag. in Act. Phytotax. Geobot. 40 (5—6):



图版4 1—4. 丽江蒲公英 *Taraxacum dasypodium* V. Soest: 1. 植株; 2. 外层总苞片; 3. 内层总苞片; 4. 瘦果。5—9. 短喙蒲公英 *T. brevirostre* Hand.-Mazz.: 5. 植株; 6. 外层总苞片; 7. 内层总苞片; 8, 9. 瘦果。10—14. 苍叶蒲公英 *T. glaucophyllum* V. Soest: 10. 植株; 11. 内层总苞片; 12. 外层总苞片; 13, 14. 瘦果。(余汉平绘)