

色，长 7—10 毫米。 花果期 3—6 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、河南、湖北、四川等省区；生于海拔 1 900—3 400 米山坡草地或路旁。朝鲜、俄罗斯、日本也有分布。模式标本采于北京郊区百花山。

全草供药用，功效同蒲公英。

32b. 狭苞蒲公英 (变种)

var. *angustibracteatum* Ling in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 3: 202. 1935; 黄土高原植物志 5: 485. 图版 89. 图 10. 1989.

本变种与原变种的区别在于：外层总苞片较狭，线形，与内层总苞片等宽。

产河北、山西；生于海拔 1 600 米左右的山坡。

33. 山西蒲公英

Taraxacum licentii V. Soest in Act. Bot. Neerl. 19: 28. 1970.

多年生草本。叶长 6—9 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，羽状浅裂至深裂，每侧裂片 3—5 片，侧裂片三角形，长达 1 厘米，先端尖或略钝，端部倒向，顶端裂片三角形。花葶比叶长，高 10—15 厘米，近顶端处密被蛛丝状毛；头状花序直径 30—35 毫米；总苞钟状，长 8—10 毫米；外层总苞片披针形，长 8 毫米，具极宽的白色膜质边缘，其余部分暗绿色，先端无小角或增厚；内层总苞片披针形，比外层总苞片长 1 倍；边缘舌状花背面具明显的暗绿色条纹，柱头干时黑色。瘦果未见成熟；冠毛白色。

产山西 (太原、五台山)；生于海拔 2 200 米的山坡草地。模式标本采自山西太原。

34. 东北蒲公英 (东北植物检索表) 图版 8: 12—15

Taraxacum ohwianum Kitam. in Act. Phytotax. Geobot. 2: 124. 1933; 东北植物检索表 442. 1959; Schischk. Fl. URSS, 29: 443. 1964; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 22: 657. 1969; 中国高等植物图鉴 4: 681. 图 6776. 1975; Kitag. Neo-Lin-eam. Fl. Mansh. 686. 1979; 内蒙古植物志 6: 292. 图版 116. 图 1. 1982; 辽宁植物志 (下册) 633. 图版 282. 图 1—4. 1992; 东北植物检索表 729. 图版 368: 1. 1995. —*T. junpeianum* Kitam. in l. c. 4: 103. 1935; 东北植物检索表 444. 图版 161. 图 3. 1959; Kitag. l. c. 685. 1979. —*T. mandshuricum* Nakai ex Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 50: 89. 1936; S. Y. Hu, l. c. 22: 655. 1969.

多年生草本。叶倒披针形，长 10—30 厘米，先端尖或钝，不规则羽状浅裂至深裂，顶端裂片菱状三角形或三角形，每侧裂片 4—5 片，稍向后，裂片三角形或长三角形，全缘或边缘疏生齿，两面疏生短柔毛或无毛。花葶多数，高 10—20 厘米，花期超出叶或与叶近等长，微被疏柔毛，近顶端处密被白色蛛丝状毛；头状花序直径 25—35 毫米；总苞长 13—15 毫米；外层总苞片花期伏贴，宽卵形，长 6—7 毫米，宽 4.5—5 毫米，先端锐尖或稍钝，无或有不明显的增厚，暗紫色，具狭窄的白色膜质边缘，边缘疏生缘