

裂,具4—7对侧裂片;侧裂片三角形,相互连接或稍有间距,倒向,近全缘。花葶1或数个,高3—7厘米,无毛或在顶端有蛛丝状柔毛;头状花序直径28—32毫米;总苞钟形,长10—12毫米,总苞片干后变墨绿色至黑色;外层总苞片宽卵形至卵状披针形,宽于内层总苞片,先端稍扩大,无膜质边缘或为极窄的不明显的膜质边缘;舌状花黄色,边缘花舌片背面有紫色条纹,柱头和花柱干后黑色。瘦果倒卵状长圆形至长圆形,淡褐色,长2.8—3.5毫米,上部1/3具小刺,顶端常突然缢缩成长约0.5毫米的圆锥至圆柱形喙基,喙纤细,长2.5—4毫米;冠毛长约6毫米,白色。

产青海南部、四川西部(甘孜州、阿坝州)、云南西北部及西藏中部和东部。生于海拔3600—5300米山坡草地、台地及河边草地上。锡金、不丹也有分布。

48. 毛柄蒲公英(云南种子植物名录) 毛葶蒲公英(西藏植物志) 图版15: 9—12


Taraxacum eriopodum (D. Don) DC. Prodr. 7(1):147. 1838; Hand.-Mazz. Monogr. Tarax. 69. 1907. p. p. et Symb. Sin. 7: 1178. 1936; V. Soest in Wentia 10: 43. 1963; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 22: 653. 1969. excl. pl. Hubei; Nasir et Ali, Fl. W. Pakistan 790. 1972; Kitam. et Gould. in Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 46. 1982; 西藏植物志 4: 936. 图 400: 1—2. 1985; Kirschn. in Edinb. J. Bot. 53(2): 217. 1996. — *Leontodon eriopodum* D. Don in Mem. Wern. Soc. Edinb. 3: 413. 1821. — *Taraxacum wattii* J. D. Hook. Fl. Brit. Ind. 3: 401. 1882.

多年生矮小草本。叶倒披针形,长8—15厘米,宽15—25毫米,羽状浅裂至半裂,侧裂片3—4对,稀不分裂;裂片钝三角形或线形,相互连接或稍有间距,平展或倒向,全缘,顶端裂片略宽,先端钝,通常长1—3厘米。花葶1至数个,和叶近等长,高5—12厘米,上部疏生淡褐色蛛丝状柔毛;头状花序直径约30—40毫米;总苞钟形,长11—14毫米,总苞片干后墨绿色;外层总苞片伏贴,直立,披针形至卵状披针形,先端增厚或有较小的小角,长(5.5—)6.5—7.5毫米,宽(2.0—)2.5—3.0毫米,无膜质边缘或具极狭的膜质边缘;内层总苞片暗绿色,常具红色边缘,先端增厚或具小角,长12—14毫米;舌状花黄色,边缘花舌片背面有暗紫色条纹,花柱和柱头干时黑色。瘦果淡麦秆黄色,长4.5—5毫米,上部1/3—1/2具小刺,顶端多少逐渐收缩为长约1毫米的圆锥形喙基,喙长4.5—7毫米。冠毛长5—7毫米,淡黄色。 $2n=32$ 。

产甘肃南部、青海、云南西北部(丽江、中甸、永胜)、四川西部及西藏等地;生于海拔3000—5300米山坡草地、河边沼泽地上。印度西北部、锡金、不丹、尼泊尔也有分布。模式标本产尼泊尔。

49. 亚东蒲公英(西藏植物志)

Taraxacum mitalii V. Soest in Wentia 2(10):46. f. 20. 1963; Kitam. et Gould. in Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 46. 1982.



图版15 1—4. 拉萨蒲公英 *Taraxacum sherriffii* V. Soest: 1. 植株; 2. 外层总苞片; 3. 内层总苞片; 4. 瘦果; 5—8. 藏蒲公英 *T. tibetanum* Hand.-Mazz.: 5. 植株; 6. 内层总苞片; 7. 外层总苞片; 8. 瘦果; 9—12. 毛柄蒲公英 *T. eriopodum* (D. Don) DC.: 9. 植株; 10. 内层总苞片; 11. 外层总苞片; 12. 瘦果。(余汉平绘)