

多年生草本。根颈部具褐色残存叶基。叶羽状深裂，侧裂片3—4对；裂片三角形或略镰刀状三角形，长5—10（—20）毫米，宽5—10毫米，先端尖或略尖，平展或倒向，裂片间具小齿或无齿；顶端裂片略呈戟形，常伸长至3厘米。花葶1至数个，和叶近等长，高达6厘米，褐色，被白色蛛丝状柔毛；头状花序直径30—40毫米；总苞钟形，长12—15毫米，灰绿色，总苞片先端增厚或具很小的小角；外层总苞片伏贴，卵形，长6—7毫米，具浅色或淡红色边缘；内层总苞片披针形，长10—15毫米；舌状花黄色，边缘花舌片背面具暗紫色或暗紫红色条纹，花柱污黄色，柱头淡暗绿色，干时近黑色。瘦果长3.5毫米，草黄色，略带橄榄绿色，上部具较粗的尖刺，下部光滑，顶端渐缩为长约1毫米的圆锥至圆柱形喙基，喙长7毫米；冠毛长5毫米，白色。 $2n=24$ 。

产西藏亚东。生于海拔2400—4500米山坡草地或杜鹃灌丛下。不丹、锡金、尼泊尔也有分布。模式标本产尼泊尔。

50. 锡金蒲公英（西藏植物志） 图版16: 1—4

Taraxacum sikkimense Hand.-Mazz. Monogr. Tarax. 103. t. 3, f. 6, t. 5, f. 5. 1907. et Symb. Sin. 7: 1178. 1936; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 22: 659. 1969; V. Soest in Wentia 10: 50. 1963; Nasir et Ali, Fl. W. Pakistan 794. 1972; Kitam. et Gould. in Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 46. 1982; 西藏植物志 4: 934. 1985.


多年生草本。叶倒披针形，长5—12厘米，通常羽状半裂至深裂，稀仅具浅齿，每侧裂片4—6片；裂片三角形至线状披针形，平展或倒向，互相连接或有间距，近全缘，顶端裂片三角形或线形，通常无毛，稀被蛛丝状毛。花葶长5—30厘米，无毛，稀有蛛丝状毛；头状花序直径40—50毫米；总苞钟形，长约15毫米，总苞片干后淡墨绿色至墨绿色；外层总苞片披针形至卵状披针形，狭或与内层总苞片等宽，先端稍扩大，具狭而明显的膜质边缘；内层总苞片先端多少有些扩大；舌状花黄色、淡黄色乃至白色，先端有时带红晕，边缘花舌片背面有紫色条纹，花柱和柱头干时黑色。瘦果倒卵状长圆形，深紫色、红棕色至橘红色，长约3毫米，上部1/3—1/2有小刺，顶端突然缢缩成长约0.5—1毫米的喙基，喙纤细，长6—8毫米；冠毛白色，长5—6毫米。 $2n=32$, 40。

产青海、四川西部、云南西北部（丽江、中甸）及西藏。生于海拔2800—4800米山坡草地或路旁。锡金、尼泊尔、巴基斯坦也有分布。

51. 滇北蒲公英（新拟）

Taraxacum suberipodum V. Soest in Act. Bot. Neerl. 19(1): 28. f. 6. 1970.

多年生草本。叶直立，灰绿色，叶柄粉红色，具翅；外层的叶羽状浅裂，侧裂片略钝，三角形或线状披针形，裂片间间距较宽，宽约1—1.5厘米，全缘或有三角状小齿，顶端裂片长3—5厘米，先端略钝，全缘稀有齿，内层叶具三角状钝齿。花葶多数，长



图版16 1—4. 锡金蒲公英 *Taraxacum sikkimense* Hand.-Mazz.: 1. 植株; 2. 外层总苞片; 3. 内层总苞片; 4. 瘦果。5—8. 灰果蒲公英 *T. maurocarpum* Dahlst.: 5. 植株; 6, 7. 外层总苞片; 8. 瘦果。9—12. 网苞蒲公英 *T. forrestii* V. Soest: 9. 植株; 10. 外层总苞片; 11. 内层总苞片; 12. 瘦果。(余汉平绘)