

于叶，高约 20 厘米，无毛，上端密被褐色蛛丝毛；头状花序直径 35—40 毫米；总苞长 14 毫米，淡红绿色；外层总苞片卵形，长 6 毫米，宽 3 毫米，有缘毛；舌状花深黄色，边缘花舌片背面有暗紫色条纹，花柱和柱头干时黑色。瘦果麦秆黄色，4.5—5 毫米，上部密被略粗的短刺，顶端突然缢缩为圆锥至圆柱形的喙基，喙基长约 1 毫米，喙长 10 毫米；冠毛污白色，长 7 毫米。

产云南西北部（中甸、宁蒗）。生于海拔 3 100—3 400 米山坡草地或林缘。模式标本采自云南西北部宁蒗县永宁。

52. 网苞蒲公英（西藏植物志） 图版 16: 9—12

Taraxacum forrestii V. Soest in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 2(10):265. Pl. 23. 1961. et in Wentia 10: 44. 1963.

多年生草本，根颈部粗，多少被蛛丝状柔毛。叶长 5—6 厘米，宽 1.8 厘米，外层叶每侧有裂片 6 片，裂片三角形，展开或反折，全缘或有小齿，顶端裂片多少钝三角形；内层叶每侧有裂片 6—8 片，裂片三角形，先端锐尖，边缘常有小齿，裂片间近无齿；顶端裂片戟形被蛛丝状毛，有短叶柄。花葶 2—3 个，比叶短，粗壮，高 5—7 厘米，被蛛丝状毛；头状花序直径约 35 毫米；总苞宽钟形，长约 16 毫米，污绿色；外层总苞片疏松、伏贴，卵形，长约 7 毫米，宽约 4 毫米，具网状脉，有明显的宽膜质边缘，先端具极小的小角；内层总苞片宽线形或披针形，宽 2 毫米，暗绿色，具膜质边缘，先端多少增厚；舌状花黄色，边缘花舌片背面有灰紫色条纹，柱头和花柱黑色。瘦果褐色，倒披针形，长 4 毫米，上部密被小刺，顶端突然缢缩为圆柱形喙基，喙纤细，长 3—5 毫米；冠毛白色，长 6 毫米。


产云南西北部（中甸）及西藏东南部。生于海拔 4 200 米处干山坡。印度也有。模式标本采自印度和西藏东南部察隅。

本种以其外苞片上的网状脉而与蒙古蒲公英组的种类相似；同时以其黑色的柱头、花柱及总苞又与藏蒲公英 *T. tibetanum* Hand.-Mazz. 类似。

53. 天全蒲公英（中药志）

Taraxacum apargiaeforme Dahlst. in Act. Hort. Gothob. 2: 178. f. 14, t. 3, f. 19—21. 1926; V. Soest in Wentia 10: 43. 1963; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 22: 650. 1969; Nasir et Ali, Fl. W. Pakistan 788. 1972.

多年生草本。根颈部具褐色残存叶基。叶长 3—4 厘米，宽 6—10 毫米，不分裂或羽状深裂，每侧裂片 5—6 片，裂片三角形，全缘，或线形，具小齿，端部倒向，顶端裂片戟形。花葶长于叶，高达 5 厘米，无毛；头状花序直径 35—45 毫米；总苞狭钟形，长约 12 毫米，暗绿色；外层总苞片卵状披针形，伏贴至平展，几无或少有显著的白色边缘或多少有粉红色边缘；内层总苞片宽线形，宽于外层总苞片；舌状花黄色，边缘花舌片背面无彩色条纹，花柱和柱头暗绿色，干时黑色。瘦果倒卵状楔形，暗麦秆黄色，



图版16 1—4. 锡金蒲公英 *Taraxacum sikkimense* Hand.-Mazz.: 1. 植株; 2. 外层总苞片; 3. 内层总苞片; 4. 瘦果。5—8. 灰果蒲公英 *T. maurocarpum* Dahlst.: 5. 植株; 6, 7. 外层总苞片; 8. 瘦果。9—12. 网苞蒲公英 *T. forrestii* V. Soest: 9. 植株; 10. 外层总苞片; 11. 内层总苞片; 12. 瘦果。(余汉平绘)