

多年生草本。根颈部被少量黑褐色残存叶基，叶基腋部被稀少的长曲毛。叶长 3—10 厘米，宽 5—15 毫米，长椭圆形，不分裂、全缘或具齿或羽状浅裂，顶裂片小，先端急尖，全缘，每侧裂片 2—3 片，三角形，平展，先端急尖，全缘，裂片间无齿或具小裂片，无毛。花葶 1—2，较粗壮，长于叶，高 7—15 厘米，无毛；头状花序直径约 15—20 毫米；总苞宽钟状，长 9—14 毫米，总苞片黑绿色，先端无角或稍有胼胝状加厚；外层总苞片卵状披针形至披针形，长 3—4 毫米，宽 2—2.5 毫米，伏贴或稍开展，几无膜质边缘，等宽或稍宽于内层总苞片；内层总苞片长为外层总苞片的 1.5—2 倍；舌状花紫红色，花冠无毛，舌片长 10—11 毫米，宽 1.5—2 毫米，基部筒长 3—3.5 毫米，柱头干时黑色。瘦果淡黄褐色，长约 3 毫米，上部 1/4 有多数小刺，其余部分具少数小瘤状突起或无瘤，顶端渐缩为长 0.5—0.7 毫米的喙基，喙长 2.5—4 毫米；冠毛白色，长约 6 毫米。 花果期 6—7 月。

产新疆（乌鲁木齐、阜康、布尔津、精河、乌苏、察布查尔、尼勒克、昭苏、和静、温宿等地）。生于海拔 2 500 米以上高山草甸、草甸草原。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦也有分布。

57. 川西蒲公英（新拟）

Taraxacum chionophilum Dahlst. in Act. Hort. Gothob. 2: 177. f. 13, t. 3, f. 13—15. 1926; S. Y. Hu in Quart. Journ. Taiwan Mus. 22: 652. 1969.

多年生草本。叶暗绿色，长 7—10 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，大头羽裂或羽状深裂，每侧裂片 4—6 片，裂片三角形，顶端裂片小，三角形或近戟形，近无毛或被稀疏的蛛丝状柔毛。花葶长于叶，上端密被蛛丝状柔毛；头状花序直径约 40 毫米；总苞狭钟形，长 12 毫米，宽 5 毫米，基部卵形，暗绿色；外层总苞片卵状披针形或线状披针形，具宽的膜质边缘，常具小齿或缘毛，先端淡紫色；内层总苞片线形；舌状花亮黄色，边缘花舌片背面有粉红色条纹，花柱和柱头黄绿色，干时黑色。瘦果倒卵状长圆形，褐色，上部 1/3 具小刺，其余部分光滑，顶端逐渐收缩为圆锥形喙基，长 1 毫米，喙长 2—4 毫米；冠毛污白色，6—7 毫米长。 花果期 6—8 月。

产四川西北部（理县、马尔康、松潘）。生于海拔 2 700—4 600 米高山草地或灌木丛下。模式标本采自四川松潘县黄龙寺。

组 14. 垂头蒲公英组（新拟）Sect. 14. Bienna R. Doll in Fedde, Repert. 93: 543. 1982; Kirschn. et Step. in Taxon 46: 89. 1997.

二年生植物。头状花序在花后下垂。

本组只有 1 种，产我国。

组模式种：垂头蒲公英 *T. nutans* Dahlst.

58. 垂头蒲公英（太原植物志） 图版 3: 10—12