

28. 1961.

多年生草本。叶直立，羽状深裂，侧裂片达长 12 毫米，狭窄，多少呈镰刀状，平展或倒向，全缘，间距很长，长可达 20 毫米，宽约 6—10 毫米，全缘，无小齿，顶端裂片长 35 毫米，长矛状，先端尖，叶柄红至紫罗兰色，狭窄，长 10 厘米。花葶长于叶，高约 35 厘米，基部红色，光滑，略粗，上端有蛛丝状毛；头状花序直径达 40 毫米；总苞钟形，长 15 毫米，暗绿色；外层总苞片披针形，至线形，长 10 毫米，具不显著的窄白色边缘，部分先端有小角；内层总苞片有宽膜质边缘；舌状花深黄色，边缘花舌片背面有紫红色条纹，花柱污黄色，柱头暗绿色。瘦果未见成熟；冠毛污白色。

产西藏（拉萨、当雄、林周）。生于海拔 3 900—5 300 米山坡草地。模式标本采自西藏林周县。

67. 中亚蒲公英（八一农学院学报） 图版 2: 10—14

*Taraxacum centrasiaticum* D. T. Zhai et Z. X. An in Journ. Aug.-1st Agr. College 18(3):4. 1995.

多年生草本。叶狭椭圆状披针形，长 8—14 厘米，宽 0.7—2 厘米，羽状深裂，裂片全缘；顶端裂片戟形，侧裂片多披针形、平展，两面无毛，叶基渐狭成长柄。花葶 2—3，高 12—22 厘米，长于叶，无毛，稀有少量细毛；总苞长 9—13 毫米，总苞片暗绿色，无角；外层总苞片披针形，伏贴，稍窄于内层总苞片或近等宽，具窄膜质边缘；内层总苞片长为外层总苞片的 2.5—3 倍；舌状花黄色，边缘花舌片背面具紫红色宽带，花冠无毛或在喉部背面有零星短柔毛。瘦果淡褐色，长约 3 毫米，上部 1/3—1/2 具有多数尖小刺，以下于果纵棱上有钝瘤，顶端喙基圆锥状，长约 0.8 毫米；喙纤细，长 5—6 毫米；冠毛长 5—6 毫米，白色。

产新疆（策勒）。生于海拔 3 500 米河谷草甸。模式标本采自新疆策勒。

68. 绯红蒲公英（八一农学院学报） 图版 6: 4—6

*Taraxacum pseudoroseum* Schischk. Fl. URSS, 29: 744. 528. 1964; Dshan. Fl. Kirgiz. SSR 11: 494. 1965; Oraz. Fl. Kazak. 9: 491. t. 53. f. 3. 1966 Иллюс. опр. раст. Казах. 2: 447. t. 79, f. 13. 1972. et Одув. Казах. и Сред. Азии 88. t. 17, f. 10. 1975.

多年生草本。根颈部无残存叶基。叶倒披针形，长 4—15 厘米，宽 8—25 毫米，羽状浅裂至羽状深裂，顶端裂片大，三角形至长三角形，全缘，先端钝，每侧裂片 2—4 片，裂片三角形，平展或倒向，先端急尖，全缘，裂片间无齿、亦无小裂片，叶基常显紫红色，两面无毛。花葶 2—5，较粗壮，高 10—20 厘米，有时带紫红色，无毛；头状花序直径 25—30 毫米；总苞宽钟状，长 14—20 毫米，总苞片先端渐尖、无角；外层总苞片淡绿色，卵状披针形至披针形，长 6—8 毫米，宽 2—4 毫米，花时反卷，具极窄的膜质边缘，等宽或宽于内层总苞片；内层总苞片绿色，长为外层总苞片的 2 倍；舌状花



图版2 1—5. 葱岑蒲公英 *Taraxacum pseudominutibum* S. Koval. : 1. 植株; 2. 叶; 3, 4. 总苞片; 5. 瘦果。6—9. 红角蒲公英 *T. lutidum* Hagl. : 6. 植株; 7, 8, 9. 总苞片。10—14. 中亚蒲公英 *T. centrasiaticum* D. T. Zhai et Z. X. An: 10. 植株; 11, 12, 13. 总苞片; 14. 瘦果。(张荣生绘)