

7—10 厘米，最宽处 2—3 (4) 厘米，先端突渐尖，基部近圆形，上表面绿色，无毛，下表面灰绿色，疏生短毛，老熟之叶片则毛茸渐次脱落而更较稀疏，叶片干后呈波状微小皱缩，次脉 6—8 对，再次脉约 8 条，小横脉清晰可见，叶缘具刺毛状坚硬之小锯齿。花果未见。

产安徽南部和浙江西北部。生于山坡或山脚处或丘陵林缘隙地上。模式标本采自安徽省休宁。

5. 狭叶倭竹 (南京大学学报, 误印为“狭倭叶竹”)

*Shibataea lanceifolia* C. H. Hu in Journ. Nanjing Univ. (Nat. Sci. ed.) 1981 (2): 257. 1981; C. H. Hu et al. in Act. Phytotax. Sin. 26 (2): 132. pl. 1 (f. 6, 7.) 1988.

5a. 狭叶倭竹 (原栽培型) 图版 88

cv. *Lanceifolia*

地下茎 (竹鞭) 节间短，长仅 1.2—1.5 厘米，径粗 6 毫米，实心或近于实心。竿高 45—100 厘米，粗 2—3 毫米，直立，中空小或近于实心，光滑无毛；节间长 3—4 厘米，竿下方不分枝的数节间呈圆筒形，上部具分枝的节间在有分枝之一侧具沟槽因而呈半圆形；竿环隆起；竿每节可分 3—5 枝，枝条短，长 0.8—1.5 厘米，共有 3—5 节，枝与竿之腋间具 1 片有 2 脊的先出叶，后者较长，迟落，以后在竿上腐烂呈纤维状；枝箨纸质，迟落，顶端具一细小的小尖头 (系缩小叶变成)。箨鞘纸质，早落，背面无毛，亦无斑点；无箨耳及鞘口繸毛；箨片细小，钻状，长 3—6 毫米。每枝具 1 或 2 叶，当具 2 叶时，下方叶片可位于上方叶片之上；叶鞘长约 2 毫米；叶舌在枝具 2 叶时，下方叶的叶舌，形短，而上方叶或枝仅具 1 叶时，其叶舌为膜质，三角形，但常席卷呈锥状，长约 5 毫米，略弯曲；叶片披针形，长 8—12 厘米或更长，宽 0.8—1.6 厘米，先端渐尖，尾状，基部楔形，略下延，上表面绿色，无毛，下表面淡绿色，在次脉上有较密的短毛，两面均可见清晰的小横脉，叶缘有小锯齿。花枝生于具叶枝下部之各节上，共 2—4 枝，每一花枝还可再具 2—5 条次级枝，花枝下方托以大形佛焰苞状的苞片，基部有 1 片先出叶，每次级花枝生有 2—4 枚无柄假小穗，有时下方假小穗退化消失而仅具 1 顶生假小穗；假小穗线形，长 1.5—2 厘米，基部亦具先出叶和苞片 (上方或顶生的假小穗则此两者俱缺)，苞片 2 或 3，纸质，披针形，9—13 脉，上方者苞片内的芽体较大，下方者芽小或无芽；每小穗含小花 3—5 朵，通常仅 1 或 2 朵能育，其余在上方的诸小花退化为雄性或中性；外稃草质，披针形，淡绿色，长 1.2 厘米，具 11 脉；内稃较薄，约与其外稃等长；鳞被膜质透明；花丝细长，花药金黄色；子房长椭圆形，花柱 1，柱头 3 (常先二裂然后其中一裂柱再裂为 2)，其上具毛茸。颖果细小，长卵形。笋期 5—6 月，花期 3—4 月。

产浙江、福建等省。生于海拔 500 米左右之山林地带。模式标本采自福建崇安，有花标本采自杭州。