

5b. 翡翠倭竹 (栽培型) (植物分类学报)

cv. *Smaragdina*

Shibataea lanceifolia C. H. Hu f. *smaragdina* C. H. Hu in Act. Phytotax. Sin. 26 (2): 134. 1988.

本栽培型的叶片以具 3—5 条黄色细窄条纹而与原栽培型不同。

江苏南京和浙江杭州都已栽培。

叶片具黄色纵条纹, 可供观赏。

6. 南平倭竹 (武夷科学)

Shibataea nanpingensis Q. F. Zheng et K. F. Huang in Wuyi Sci. Journ. 2: 17. f. 1. 1982; C. H. Hu et al. in Act. Phytotax. Sin. 26 (2): 135. pl. 2. 1988.

6a. 南平倭竹 (原变种) 图版 87: 8

var. *nanpingensis*

竿高 1—1.7 米。粗 4—5 毫米, 绿色; 基部节间呈圆筒形, 惟具分枝之节间的一侧因具沟槽而呈三棱形, 中部的节间长 25—30 (40) 厘米; 箨环稍隆起; 竿环明显隆起; 节内长约 5 毫米; 竿每节具 3 枝, 枝短, 长仅 1.5—1.7 厘米, 共 2 至数节, 且不再分枝。箨鞘短于其节间, 淡绿色, 背部被白色细柔毛, 尤以基部为密, 此柔毛早落, 但毛基仍存留; 箨片绿色, 条形, 长 3—6 毫米; 无箨耳及鞘口缝毛; 箨舌隆起, 高 1.5—4 毫米, 上缘具短纤毛。每枝仅具 1 叶; 叶片椭圆状披针形, 长 17—18 (24) 厘米, 宽 2.5—3 厘米, 先端渐尖, 尾状, 基部楔形, 略下延, 边缘有小锯齿, 两面无毛, 均可见到小横脉, 次脉 7—9 对。花果未见。 笋期 6—7 月。

产福建南平及崇安一带。模式标本采自南平县后坪。本种为此属中个体较高大者。

6b. 福建倭竹 (变种) (植物分类学报)

var. *fujianica* (C. D. Chu et H. Y. Zhou) C. H. Hu comb. nov. — *Shibataea fujianica* C. D. Chu et H. Y. Zhou ex C. H. Hu et al. in Act. Phytotax. Sin. 26 (2): 134. f. 1 (1—5) 1988.

不同于原变种在于叶之下表面无毛。

分布于福建南平、崇安一带。模式标本采自南平县山兴。

7. 鹅毛竹 (浙江建德) 倭竹 (种子植物名称), 小竹 (浙江通志、处州府志、青田县志)

Shibataea chinensis Nakai in Journ. Jap. Bot. 9: 81. 1933. 中国主要植物图说·禾本科 111 页。图 81. 1959; 江苏植物志, 上册 161 页。图 257. 1976; 竹的种类及栽培利用 95 页。图 32. 1984; C. H. Hu et al. in Act. Phytotax. Sin. 26 (2): 136. 1988; 中国竹谱 61 页。1988.

7a. 鹅毛竹 (原变种) 图版 87: 1—3