

15 毫米，先端长渐尖，基部宽楔形，次脉 4 或 5 对。花果未见。

本种现仅知分布在贵州都匀。海拔 1 100 米。模式标本采自都匀斗蓬山。

本种笋味鲜美，可鲜食或加工为笋干及制罐头，同时竹株姿态优美，亦可作观赏竹种。

7. 乳纹方竹 (竹子研究汇刊)

Chimonobambusa lactistriata W. D. Li et Q. X. Wu in Journ. Bamb. Res. 4 (1): 46. pl. 2. 1985. Hsueh et W. P. Zhang in Bamb. Res. 7 (3): 9. 1988. D. Ohnrb., Gen. *Chimonobambusa* 19. 1990.

竿高 4—5 米，粗 2—4 厘米，中下部各节环生刺状气生根 4—19 条；节间有钝四棱，略呈方形，长 11—13 厘米，幼时绿色并具紫色小斑点，疏生短的疣基刺毛，以后因疣基存于竿上而粗糙；箨环留有箨鞘基部及具紫色柔毛；竿环在具分枝之各节强烈隆起而呈脊状；枝实心，其节强烈隆起呈脊状。箨鞘脱落性，长于其节间，纸质（鞘的中上部逐渐变薄并有皱褶），幼笋时呈暗紫色，以后呈黄褐色，有淡绿色或乳白色的纵条纹，除竿下部箨鞘在背面疏生向上的淡褐色疣基刺毛外，竿中上部者均无毛，鞘缘密生淡黄色纤毛，小横脉明显，紫色；箨耳不发达；箨舌极矮小，拱形；箨片由箨鞘顶端向上收缩而成，呈小锥形。末级小枝具 4—6 (9) 叶；叶鞘疏松包裹，背部无毛，边缘有少量白色纤毛；叶耳不发达，鞘口繸毛仅数条，苍白色，脱落性，劲直，长 3—5 毫米；叶舌拱形，边缘生微小纤毛；叶片椭圆状披针形，长 8—17 厘米，宽 8—20 毫米，下表面具疏稀柔毛，向主脉的基部则密生细柔毛，次脉 4—6 对，小横脉尚明显，呈长方格状；叶柄短，两面密被细柔毛。花枝未见。 笋期 10 月。

本种现仅知产于贵州省册亨县及荔波县。生于海拔约 500 米的常绿阔叶林下。模式标本采自册亨。

笋供食用。

8. 缅甸方竹 (竹子研究汇刊)

Chimonobambusa armata (Gamble) Hsueh et Yi in Journ Bamb. Res. 2 (1): 38. 1983; Hsueh et W. P. Zhang in ibid. 7 (1): 21. 1988. et in Bamb. Res. 7 (3): 9. 1988; C. S. Chao et S. A. Renv., Kew Bull. 44: 366. 1989; D. Ohnrb., Gen. *Chimonobambusa* 13. 1990; 云南树木图志下册, 1473 页, 图 697. 1991. — *Arundinaria armata* Gamble in Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta 7: 130. pl. 119. 1896. et in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 7: 385. 1897; Brandis, Ind. Trees. 665. 1906; E. G. Camus, Bambus. 37. 1913; Rhind, Grass. Burma 11. 1945. — *Oreocalamus armatus* (Gamble) Wen in Journ. Bamb. Res. 5 (2): 22. 1986. “armata”.

竿高 3—5 米，最高可达 10 余米，径 1—3 厘米，竿中下部数节均具刺状气生根；节间光滑或有时因被疣基而粗糙，圆筒形，长 12—14 厘米，竿环隆起；箨环留有箨鞘基部残余，且密生一圈黄褐色具光泽的绒毛环；竿每节具 3 枝，枝条的枝环甚隆起。箨鞘迟