

笋味美，供食用；竿可用于编织家器和供造纸原料。

6. 光竹 (云南植物研究)

Qiongzhuea luzhiensis Hsueh et Yi in Act. Bot. Yunnan. **5** (1): 45. f. 4. 1983; D. Z. Li et Hsueh in ibid. **10** (1): 54. 1988; D. Ohnrb. Gen. Qiongzhuea ed. 3. 8. 1989. — *Oreocalamus luzhiensis* (Hsueh et Yi) Keng f. in Journ. Nanjing Univ. (Nat. Sci. ed.) **22** (3): 416. 1986. — *Chimonobambusa luzhiensis* (Hsueh et Yi) Wen et D. Ohnrb. ex D. Ohnrb., Gen. Chimonobambusa 20. 1990.

竿直立，高 2.5—5 米，直径 1—2 厘米；节间长 (10) 14—18 (20) 厘米，圆筒形或微呈四棱形，绿色，被白粉而无毛，在近分枝一侧具 2 沟槽，稀具 1 沟槽，竿壁厚 3—5 毫米，髓为粉质；竿环明显，无毛，光亮；箨环明显，初具散生的黄褐色硬毛和箨鞘基部残留物；节内长 1—3 毫米，无毛；竿芽圆锥形，长 4—5 毫米，黄褐色，光亮，被短柔毛；竿每节具 3 (5) 分枝，枝斜展，各枝节处微隆起，无毛。笋具紫褐色纵条纹，稀可被毛；竿箨宿存，箨鞘革质，红褐色或黄褐色，长三角形，先端截形，背面疏被棕色刚毛，纵脉明显，边缘密生棕色刚毛；无箨耳，鞘口缝毛 2 或 3 条，长 2—5 毫米，直立或微波曲，易脱落；箨舌截形，黄褐色，高约 1 毫米，初时边缘生短柔毛；箨片直立，三角形、线形或披针形，长 2—9 毫米，宽 1—2 毫米，基部窄于箨鞘之顶宽，紫褐色或黄褐色，无毛，纵脉明显，边缘常内卷。末级小枝具 2—3 (4) 叶；叶鞘长 3.5—5 (8) 厘米，边缘密生棕色纤毛；无叶耳；鞘口缝毛 3—5 条，长 3—5 毫米，灰色；叶舌截形，无毛，高约 1 毫米；叶片披针形，厚纸质，无毛，长 (7) 15—23 (30) 厘米，宽 (11) 16—20 (24) 毫米，次脉 5—7 对，小横脉明显，叶缘具稀疏细锯齿因而微粗糙。花枝未见。

笋期 9—10 月。

特产于贵州六枝。模式标本产地生于海拔 1700—1900 米的阔叶林下。

笋味鲜美，供食用；竿用于造纸，亦可劈篾制作农用器用。

7. 大叶箬竹 (植物分类学报)

Qiongzhuea macrophylla Hsueh et Yi in Act. Phytotax. Sin. **23**(5): 398. f. 1. 1985; D. Z. Li et Hsueh in Act. Bot. Yunnan. **10**(1): 51. 1988; D. Ohnrb., Gen. Qiongzhuea ed. 3. 8. 1989. — *Chimonobambusa macrophylla* (Hsueh et Yi) Wen et D. Ohnrb. ex D. Ohnrb., Chimonobambusa 21. 1990.

7a. 大叶箬竹 (原变型)

f. *macrophylla*

竿高 2—6 米，直径 1.5—2.1 厘米；节间长 18—29 厘米，圆筒形，但在分枝的一侧扁平，无毛，亦无白粉，竿壁厚 2.5—3.5 毫米；竿环极度隆起成脊，脊处形状不对称而容易脆断；节内较长，通常其长为 4—7 毫米。笋紫绿色，无毛；箨鞘早落，厚纸质，三角状长圆形，竿上部者为短三角形，较其节间为短，背部无毛，边缘生纤毛，纵肋明显；