

1 毫米；叶柄长 1—2 毫米；叶片狭披针形兼线状披针形，长 2.5—8 厘米，宽 2.5—5 毫米，下表面淡绿色，无毛，次脉 2 (3) 对，小横脉较清晰，叶缘一侧微有稀疏小锯齿，另一侧平滑。花枝未见。 笋期 6 月。

产四川西部。生于海拔 2 200—2 650 米的峡谷陡坡或沟谷山坡。模式标本采自四川九龙县咱日。

笋味美，供食用；竿供造纸，亦可作竹篾和农具等用。

## 2. 颈鞘箭竹 (竹子研究汇刊) 图版 107: 1—5

*Fargesia collaris* Yi in Journ. Bamb. Res. 2 (2): 21. pl. 2. 1983 et in ibid. 7 (2): 6. 1988, in clav. Sinice. ——*Thamnocalamus collaris* Yi, Fl. Xizang (西藏植物志) 5: 41. f. 19. 1988.

笋柄长 3—4.5 厘米，粗 1.3—3 厘米；节间长 2—6 毫米，幼时密被灰白色绒毛。竿高 2—6 米，粗 1—3.5 厘米；节间长 17—28 厘米，圆筒形，中空，幼时密被白粉（箨环下方有一圈 1—1.3 厘米宽的白粉环尤为显著），无毛，具较明显的纵向细肋，竿壁厚 2—3 毫米；箨环隆起，具箨鞘基部之残留物；竿环隆起；节内长 3—7 毫米，初时密被白粉。笋芽桃形，被微毛。竿每节以多枝簇生，枝长 80—100 厘米，粗 1—4 毫米。箨鞘革质，长方形，先端收窄呈短颈状，基部向两侧延伸而略呈耳状，背面无毛，纵向脉纹显著，干后变为黄褐色，上部边缘生浅黄色短纤毛；箨耳及鞘口缝毛俱缺；箨舌截形或歪形，无毛，高约 1 毫米；箨片线状披针形，外翻，略窄于箨鞘顶端之宽度，被灰白色刺毛而稍粗糙。末级小枝具 3 或 4 叶；叶鞘长 2—5.5 厘米，无毛；叶耳及鞘口缝毛俱缺；叶舌呈舌状突出，通常紫色，无毛，高约 1 毫米；叶柄长 1.5—5 毫米；叶片披针形，长 2—12.5 厘米，宽 3—19 毫米，质地较薄，下表面淡绿色，微粗糙，基部圆形或阔楔形，次脉 3 或 4 对，小横脉不发达，叶缘具小锯齿而粗糙。花枝未见。 笋期 4—5 月。

产西藏南部。海拔 2 200—3 000 米。模式标本采自西藏聂拉木县樟木口岸。

竿材劈篾供编织竹器。

系 2. 纤枝系 Ser. Ampullares Yi in Journ. Bamb. Res. 7 (2): 16. 1988.

竿各节所生的枝条近等粗而纤细，径粗 1—1.5 (2) 毫米；竿粗 0.6—1.5 (2) 厘米。叶片的小横脉不明显。


模式种：樟木箭竹 *Fargesia ampullaris* Yi

本系计有下列 5 种，分布在四川和西藏。

## 3. 圆芽箭竹 (竹子研究汇刊) 图版 108: 7—9

*Fargesia semiorbiculata* Yi in Journ. Bamb. Res. 2 (2): 40. pl. 9. 1983 et in ibid. 7 (2): 6. 1988, in clav. Sinice. 西藏植物志 5: 32 页，图 14. 1988.

笋柄长 2—4 厘米，径粗 1.2—2.5 厘米；节间长 1—4 毫米。竿高达 4.2 米，径粗 6—



图版 107 1-5. 颈鞘箭竹 *Fargesia collaris* Yi: 1. 地下茎及笋之基部; 2. 笋之一段, 示笋芽; 3. 笋之一段, 示分枝; 4. 笋箨; 5. 叶枝。6-7. 岩斑竹 *Fargesia canaliculata* Yi: 6. 笋之一段, 示分枝; 7. 笋箨。(杨林绘)