

本种笋味淡甜，在其分布地区内为大熊猫最主要的食用竹之一。

14. 秃鞘箭竹 (竹子研究汇刊) 图版 112: 14


*Fargesia similaris* Hsueh et Yi in Journ. Bamb. Res. 7 (2): 8, 25. pl. 4. 1988; 云南树木图志下册, 1314 页, 1991.

灌木状竹类。竿粗 8—12 毫米; 节间长 9.5—18.2 厘米, 圆筒形, 淡黄色, 无毛, 节下方密被白粉或黑垢, 纵向细肋不明显, 竿壁厚 2—3 毫米, 髓初时呈层片状; 箨环微隆起, 较窄; 箨环隆起; 节内长 2—3.5 毫米。枝条在竿每节为 3—8 (15) 枝簇生, 近于贴竿或与竿成 30 度锐角开展, 各枝直径 1—1.7 毫米。箨鞘黄色, 下部软骨质, 上部革质, 三角状长圆形, 短于其节间, 先端微作短三角状圆形, 背面无毛, 近顶端微有白粉, 纵肋在鞘中部以上明显, 在下部则不明显, 边缘密生纤毛; 箨耳无, 鞘口无繸毛或各具 1—3 条短繸毛; 箨舌截形, 无毛, 高约 1 毫米; 箨片直立, 三角状锥形, 基部较箨鞘顶端为窄, 无毛, 纵向脉纹明显, 小横脉可见。小枝具 2—4 叶; 叶鞘紫色, 长 2.2—3.2 厘米, 无毛或近边缘处生有白色短柔毛, 边缘无纤毛或有时密生纤毛; 叶耳缺, 鞘口两肩各具长 2—4 毫米黄褐或灰色向上微弯曲的繸毛 2—6 条; 叶舌截形, 无毛, 高 1 毫米; 叶柄长 1 毫米, 幼时两面疏生灰白色柔毛, 以后变为无毛; 叶片狭披针形, 长 1.3—6.5 厘米, 宽 4—6 毫米, 基部阔楔形, 下表面淡绿色, 无毛或幼时在近叶柄处有灰白色柔毛, 次脉 (2) 3 对, 小横脉清晰, 叶缘之一侧具小锯齿而微粗糙, 另一侧则近于平滑。花枝未见。产云南。模式标本采自云南 (地点不详)。

15. 伞把竹 (竹子研究汇刊) 图版 113: 1—7

*Fargesia utilis* Yi Journ. Bamb. Res. 7 (2): 8, 28. pl. 5. 1988; 云南树木图志下册, 1316 页, 图 608. 1991.

竿柄长 5—10 厘米, 粗 1.8—2.5 厘米。竿直立, 高达 4 米, 粗 1.5—2.5 厘米; 节间一般长 15—17 (20) 厘米, 竿基数节间长 3—6 厘米, 圆筒形, 无毛, 幼时微被白粉, 无纵向细肋, 竿壁厚 2.5—5 毫米; 箨环隆起, 幼时被微毛或无毛; 竿环较平坦或在分枝之节为隆起, 幼时有时微被白粉; 节内长 2—3 毫米, 幼时其间有时亦微被白粉, 颜色绿, 但较节间为淡。竿芽三角状卵形, 表面具小硬毛, 边缘生纤毛。枝条在竿每节为 (3) 7—18 枝簇生, 与竿作小于 45 度的锐角开展, 直径 1—1.5 毫米。笋紫色, 具极稀疏的黄褐色或灰黄色刺毛, 微被白粉; 箨鞘宿存, 长于其节间, 革质, 长圆形, 顶端宽 1.5—2 厘米, 两肩常微高起而略呈“山”字形, 背面有时微被白粉和极稀疏的黄褐色刺毛或小刺毛, 纵向脉纹明显, 边缘无纤毛; 箨耳及鞘口繸毛俱缺; 箨舌略呈“山”字形突出, 常不对称, 无毛, 高不及 1 毫米; 箨片长三角形至带状披针形, 薄革质, 在竿之下部箨者直立, 上部者外翻, 基部不收缩, 窄于或显著窄于箨鞘之顶端, 无毛, 常平展而不内卷。小枝具 (1) 2 叶; 叶鞘长 1.5—3.5 厘米, 边缘无纤毛; 叶耳及鞘口繸毛俱缺; 叶舌截形, 无毛, 高不及 1 毫米; 叶柄长约 1 毫米; 叶片狭披针形, 无毛, 长 4—10 厘米, 宽 5—10



图版 112 1. 4. 神衣箭竹 *Fargesia muriei* (Gamble) Yi; 1. 竿之一段, 示芽; 2. 竿之一段, 示分枝; 3. 箨; 4. 叶枝。5. 13. 缺苞箭竹 *Fargesia denudata* Yi; 5. 箨; 6. 花枝; 7. 花序; 8. 9. 外稃; 10. 内稃; 11. 鳞被; 12. 雄蕊; 13. 雌蕊。14. 秃鞘箭竹 *Fargesia similis* Hsueh et Yi;

箨。 (杨林绘)