

节处微隆起，竿环略高于箨环；竿之每节具 3 枝。竿箨脱落；箨鞘革质，背部黄绿色，无斑点，被厚白粉及较密的棕色平伏刺毛，基部刺毛尤密，竿下部箨鞘的边缘具硬纤毛；箨耳及鞘口缝毛俱缺；箨舌高约 3.5 毫米，中部隆起，背部无毛，边缘具纤毛；箨片直立或开展，绿色带紫色，三角状卵形至线状披针形，基部收缩。每小枝具 2 或 3 叶；叶鞘背部及边缘无毛；叶耳及鞘口缝毛俱缺；叶舌高 1—1.5 毫米，先端拱形隆起，边缘具微纤毛；叶片线状披针形，两面均无毛，长 9—16 厘米，宽 9—15 毫米。总状花序由 2 或 3 稀可多至 6 枚小穗组成；花序柄纤细，下部为鞘状苞片所包；花序轴纤细，近于无毛；小穗柄纤细，长 10—15 毫米，近于无毛；小穗披针形至线状披针形，长 1.5—3.7 厘米，宽 1.5—3 毫米，含小花 3—7 朵；小穗轴节间长 4—5 毫米，内侧扁平，顶端具微纤毛；颖常为 2 片，第一颖小，纵脉不明显，第二颖长 7—10 毫米，9 脉；外稃长 11—13 毫米，具微糙毛，9—15 脉，小横脉仅在腹面明显，先端渐尖成小尖头；内稃长 7—10 毫米，2 脊明显，其脊上具纤毛，先端钝圆；鳞被 3，有数条细脉纹，边缘生有细纤毛；雄蕊 3 或 4 枚；花柱 1，柱头 3，羽毛状。果实未见。 箐期 5 月，花期 4—5 月。

产福建，浙江有栽培。生于林中。模式标本采自福建闽清。

本种竿壁较薄，可劈篾用于编桶；叶在当地用以治小儿惊风。

9. 秀英竹（香港竹谱） 图版 178：1—3

Oligostachyum shiuyingianum (Chia et But) G. H. Ye et Z. P. Wang in Journ. Nanjing Univ. (Nat. Sci. ed.) 26 (3): 486. 1990. — *Arundinaria shiuyingiana* Chia et But. in Kew Bull. 37 (4): 591. f. 1. 1983; 香港竹谱 25 页. 1985.

竿高 4—6 米，直径 1—2 厘米；节间长 22—38 厘米，中、下部在有分枝之一侧扁平，幼时常有紫色斑点并疏生短刺毛；竿环明显隆起，高于箨环；竿中部各节常分 3 枝。竿箨早落或迟落；箨鞘黄绿色，基部略带褐色，背部具淡棕色细刺毛，边缘具纤毛；箨耳小形，具缝毛 2 或 3 条；箨舌截形，高约 1 毫米，边缘有白色微纤毛；箨片直立，绿带褐色，卵状披针形或披针形，基底宽度约为箨鞘顶端之半。叶于开花枝条上为 5—9 片；叶鞘无毛，常带紫色小斑点；叶耳不发达，鞘口缝毛 2 或 3 条；叶舌截形，微伸出，暗紫色，高 0.5—1 毫米，背部有毛；叶片线状披针形，长 12—20 厘米，宽 8—13 毫米，两面无毛，下表面有小横脉，呈狭长方格状。花序总状或简单的圆锥状，仅具小穗 2—4 枚；花序柄之全部或有时连同花序下部的分枝可为鞘状苞片所包没；花序轴及分枝均纤细，光滑无毛，或在分枝的棱上有稀疏的糙毛；小穗披针形，长 3—8 厘米，宽 4.5—5 毫米，含小花 5—15 朵；颖 2，先端具小尖头，第一颖较小，长 8—9 毫米；外稃连同长 2—3 毫米的短芒在内长 17—20 毫米，背部有紫色斑点及脱落性柔毛；内稃长 12—14 毫米，具柔毛，脊上疏生小纤毛，顶端钝，并具有丛毛；鳞被 3；雄蕊 3；花柱 1，柱头 3。

本种仅知分布于香港（模式标本产地）。

10. 四季竹（竹子研究汇刊） 图版 178：4—11



图版 178 1—3. 秀英竹 *Oligostachyum shiuyingianum* (Chia et Bur) G. H. Ye et Z. P. Wang;
 4—11. 四季竹 *Oligostachyum lubricum* (Wen) Keng f. 4. 花枝; 5. 竿箨; 6. 外稃; 7. 内稃; 8. 内稃顶端, 示三裂; 9. 鳞被; 10. 雄蕊; 11. 雌蕊。(蔡淑琴绘)