

16 厘米, 宽 1—2.5 厘米, 先端急尖而延伸, 基部圆, 多少有点偏斜, 两面均无毛, 或仅叶下表面基部有毛, 次脉 5 或 6 对, 小横脉明显; 叶柄长 2—5 毫米。花枝未见。 笋期 6 月。

产浙江。生于山坡或平原。模式标本采自仙居县潜山。

14. 皱苦竹 (竹子研究汇刊)

Pleioblastus rugatus Wen et S. Y. Chen in Journ. Bamb. Res. 1 (1): 26. pl. 4. 1982.

竿高达 5 米, 粗 2 厘米, 最粗可达 6 厘米许; 节间长 35 厘米, 竿壁较厚; 节略隆起, 节下方有白粉环; 箨环有白色细毛。箨鞘革质, 较硬, 背部被脱落性刺毛, 基部有绵毛, 先端急尖; 箨耳镰形开展, 边缘有长约 8 毫米之缝毛, 两面均粗糙; 箨舌略呈弓状或近截形, 先端边缘生有细毛; 箨片长三角形, 直立而强烈皱褶, 背部被绢毛。末级小枝具 3 或 4 叶; 叶鞘长约 5 厘米, 无毛, 嫩时有小横脉; 叶耳与缝毛通常俱缺; 叶舌高达 2 毫米, 卵状突起, 无毛, 有白粉; 叶片披针形乃至长椭圆形, 长 11—18 厘米, 宽 14—30 毫米, 基部钝圆, 收缩成长为 2—3 毫米之叶柄, 无毛, 先端急尖而延伸, 通常无毛, 次脉 5—7 对, 脉间有细脉 9 条, 具小横脉。小穗长约 3 厘米, 含 5—7 朵小花; 颖 3 片; 外稃长 9 毫米, 宽约 3 毫米, 有 7—9 脉, 顶端尖; 内稃稍长于外稃, 上部被毛茸, 沿 2 脊和边缘生有纤毛, 脊间有 3 脉, 脊外至边缘各具 2 脉; 鳞被 3; 子房全无; 花柱被小粗硬毛; 柱头 3, 羽毛状。果实未见。

产浙江黄岩。模式标本采自黄岩小英山。

15. 宜兴苦竹 (植物分类学报)

Pleioblastus yixingensis S. L. Chen et S. Y. Chen in Act. Phytotax. Sin. 21 (4): 411. f. 9. 1983; 中国竹谱 98 页, 1988.

竿直立, 高 3—5 米, 粗 1.2—2 厘米, 竿壁厚 0.3 厘米, 新竿黄绿色微带紫色, 无毛, 厚被白粉, 老竿暗绿带黄, 被粘附性灰黑色粉质, 全竿约共有 21 节间; 节间通常长 17—18 厘米, 圆筒形, 仅在在有分枝一侧的基部微凹; 竿环稍隆起, 与箨环同高; 节内长约 5 毫米, 满被粘附性黑粉; 箨环多少被有木栓质残留物; 分枝习性低, 竿每节分 3—5 枝, 与主竿成 45°—50° 夹角, 当年的枝环下方白粉圈明显。箨鞘绿色至绿黄色, 先端边缘焦枯色, 薄革质或厚牛皮纸质, 迟落, 背部被脱落性厚白粉 (呈粉绿色), 还被有紫色小刺毛, 边缘有紫红色较长纤毛, 基部生不明显的纤毛; 箨耳新月形, 紫红色紧贴的鞘口上, 耳缘着生粗壮的紫红色缝毛, 后者通直而粗糙, 长 0.5—1 厘米; 箨舌高 4—5 毫米, 先端隆起或截形, 密被厚白粉; 箨片紫绿色, 狭短条状或披针形, 外翻, 两面均密被白色短毛, 尤以腹面更显著, 先端短尖, 基部向内微收窄, 两边缘具细齿。末级小枝具 4 或 5 叶; 叶鞘无毛; 叶耳形状不稳定, 耳缘着生有枯草色至淡紫红色放射状缝毛; 叶舌隆起, 高达 3 毫米, 膜质, 厚被白粉; 叶片椭圆状披针形, 长 13.5—24 厘米, 宽 2—3 厘米, 先