

端渐尖，基部楔形，上表面绿色无毛，下表面绿色略淡，被短绒毛，沿主脉和叶基部有白色短纤毛，次脉 6—8 对，叶缘有细锯齿。花枝未见。 笋期 5 月初。

产江苏。生于低山丘陵，杭州有栽培。模式标本采自杭州植物园，引自宜兴。

本种竿较坚硬，可作伞柄或支架等。

16. 武夷山苦竹 (武夷科学)

Pleioblastus wuyishanensis Q. F. Zheng et K. F. Huang in Wuyi Sci. Journ. 2: 17. f. 2. 1982.

竿高 5 米，粗 3.5 厘米，竿壁厚 7 毫米，全竿计 21 节，幼竿厚被白粉，老竿变为深黑色粉垢；节间最长达 33 厘米，圆筒形，在分枝一侧的基部微凹，髓为隔膜状；竿环稍隆起；节内长 5—6 毫米；箨环具突起之箨鞘基部残留物，致呈木栓质的一圈阔圆环，与竿环等高或略低；竿每节具 3—7 枝，枝的大小近相等，直立，紧贴主竿，枝的基部数节初被白粉，后变为深黑色粉垢。箨鞘革质，黄绿色，与节间等长或略短，宿存，背部被白粉，几无毛或有极少量的脱落性紫色刺毛，基部微被灰色短柔毛，边缘疏生纤毛或无毛；箨耳小，半圆形或镰形，具长 3—5 毫米之繸毛；箨舌截形，紫色，高约 1 毫米，边缘生短纤毛或无毛；箨片披针形，长 2.5—6 厘米，展开或外翻，基部具粉状短毛。末级小枝具 3 或 4 叶；叶鞘无毛，微被白粉；叶耳及鞘口繸毛均缺；叶舌截形，高约 1.5 毫米；叶片披针形，长 8—14 厘米，宽 1.5—2.2 厘米，叶缘之一边有锯齿，另一边近全缘，次脉 5 或 6 对，下表面在基部微被白色短柔毛。花枝未见。

产福建崇安 (模式标本产地)。生于海拔 200 米的山坡。

17. 三明苦竹 (植物研究) 图版 185

Pleioblastus sanmingensis S. L. Chen et G. Y. Sheng in Bull. Bot. Res. 11 (4): 2, 3, 1991.

竿高约 5 米，粗约 3 厘米，竿壁厚 0.8 厘米，幼竿被厚白粉，老竿黄褐色，被不均匀的黑灰色粉质，节处及分枝基部被黑色粉层；节间一般长 33 厘米，最长者可达 40 厘米，圆筒形，在分枝一侧的基部有凹槽；竿环高于箨环；箨环具木栓质残留物；竿每节具 3—5 枝，与主竿约成 40° 的夹角。箨鞘革质，黄褐色，边缘乳黄色，背部密具大小不一的紫色斑点，尤以上部略显，表面被薄蜡质和疏被疣基刺毛或毛压贴的凹痕；鞘基密具刺毛，边缘生短纤毛，后者常易脱落变为无毛；箨耳大，卵圆形至椭圆形，紫色，两面均密具毛，边缘具粗壮劲直的放射状伸展之褐色繸毛，后者长约 1 厘米；箨舌拱形，紫色，高约 1 厘米，背部具细毛或近无毛，但基部密具糙毛，顶端高低不平，边缘无毛；箨片绿色，线状披针形而呈狭条状，外翻乃至下垂，先端渐尖，基部略向内收窄，近基部被糙毛，两面均无毛，具明显纵条纹，两边缘具极细锯齿。末级小枝具 3 或 4 叶；叶鞘背部一般无毛，上部薄被白粉，尤以节下方更显著，偶见具贴伏刺毛，毛落后常在鞘表面留有凹痕，鞘基有一圈细毛；叶舌拱形，高 2—3.5 毫米或更高；叶耳卵状至椭圆状，