

1918. — *Pleiblastus kunishii* (Hayata) Ohki in Bot. Mag. Tokyo **42**: 581. 1928. — *Pseudosasa kunishii* (Hayata) Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed. 2. 1389. 1931; Kanehira. Form. Trees 69. 1936; 竹的种类及栽培利用 159 页. 1984. — *Sinobambusa kunishii* (Hayata) Nakai in Rika Ryoiku (理科教育) **15**: 77. 1932; W. C. Lin in Taiwan For. Res. Inst. No. **69**: 132. f. 54. 1961; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 913. 1963; Fl. Taiwan **5**: 739. pl. 1498. 1978. — *Sinarundinaria kunshii* (Hayata) Kanehira et Hatusima in Trans Nat. Hist. Soc. Form. **29**: 25. 1939. — *Pseudosasa taiwanensis* Masamune et Mori in Trans. Nat. Hist. Soc. Form. **30**: 239. 1940.

竿直立，光滑无毛，高 2—6 米，粗 1—2.5 厘米；节间长 20—35 厘米；节稍隆起，每节分 3 枝，但有时可为多枝簇生。竿箨脱落性；箨鞘革质、硬脆，幼时呈淡绿色并带有紫色，老则呈灰褐色，背部密生小刺毛，鞘缘无纤毛；箨耳小，生有数条褐色短繸毛；箨舌截形；箨片呈锥状，锐尖，全缘；末级小枝具 1—3 叶，但通常仅具 1 叶；叶鞘无毛；叶柄长 7—10 毫米；叶耳不明显；叶舌隆起，呈圆拱形，边缘生小刺毛；叶片披针状长圆形或长圆形，长 10—25 厘米，宽 2—3.5 厘米，先端尖锐，基部楔形，次脉 7—9 对，在两次脉间的三次脉凡 7 条，小横脉显著，呈方格状，叶缘近于全缘。花枝未见。

台湾特产，分布在该岛中部和北部，海拔 300—1500 米的各地区。模式标本采自南投。


3. 箭靶竹 (竹子研究汇刊) 图版 189: 3, 4

Gelidocalamus longinternodus Wen et S. C. Chen in Journ. Bamb. Res. **5** (2): 24. pl. 6. 1986.

竿高 5 米，粗 3 厘米，幼竿在节下方密被黑褐色短刺毛；节间长 50—70 厘米，绿色，中空，竿壁厚 2—4 毫米，箨环略隆起；竿环在分枝一侧的另一面隆起；节内长 10—12 毫米，光亮；竿每节分 8—21 枝，小枝初被刺毛，节下方有白粉。竿箨宿存；箨鞘革质，远较其节间为短，先端渐狭窄，初为绿紫色，背部密被黑褐色刺毛，基底近于无毛，边缘整齐着生褐色纤毛；箨耳三角形至椭圆状，直立，表面被棕褐色粗毛，边缘密生长为 5—7 毫米的繸毛，先端竿箨上的箨耳繸毛直立，长达 13 毫米；箨舌高 2—3 毫米，表面被褐色粗毛，先端呈弓状突起，具长为 15 毫米淡黄色流苏状的繸毛；箨片革质，狭披针形，直立，无毛。小枝通常具 1 叶，亦可多至 3 叶；叶鞘长 9—10 厘米，初被棕褐色刺毛，后变无毛；叶耳伸出呈镰形，易折断，边缘有长达 12 毫米的褐色繸毛，直立或开展；叶舌强拱形，高 2 毫米，先端生长纤毛；叶片广披针形至椭圆状，长 28—40 厘米，宽 45—55 毫米，基部钝圆或渐尖，收缩为长 10—15 毫米之叶柄，先端渐尖至急尖，呈尾状延伸，下表面中脉附近具棕色细柔毛，次脉 9—11 对，具小横脉。花枝未见。秋冬出笋。

产湖南靖州坳上乡低山 (模式标本产地)。

4. 掌竿竹 (竹子研究汇刊)



图版 189 1, 2. 实心短枝竹 *Celidocalamus solidus* C. D. Chu et C. S. Chao: 1. 竿之一段, 示分枝及叶; 2. 竿箨。3, 4. 箭靶竹 *Gelidocalamus longinternodus* Wen et S. C. Chen: 3. 竿之一段, 示分枝; 4. 幼竿的一段, 示竿箨。(1, 2 张世经绘; 3, 4 金沙绘)