

台湾产此种形态描述,与托竹 *P. cantori* (Munro) Keng f. 很相似,惟托竹箨耳、叶耳明显,其上还有长约5毫米的缝毛可与本种相区别。

3. 庐山茶竿竹 (植物研究) 图版 193

Pseudosasa hirta S. L. Chen et G. Y. Sheng in Bull. Bot. Res. 11 (4): 3, 4. 1991.

竿高约3.5米,粗约8毫米,幼竿具一层较厚或薄的灰黄色氈状绒毛;节间长约33—(47)厘米,圆筒形,在分枝一侧的基部有浅凹槽,空腔极小,几呈实心;竿环平坦;节内长约6毫米,有光泽;箨环微隆起;竿每节分1—3枝,贴竿而生,上举,无二级分枝,嫩枝被密而厚的淡黄色绒毛。箨鞘宿存,长仅为节间之半,厚纸质,背部密被深棕色短刺毛,基部密被深棕色向下的长刺毛,边缘生深棕色纤毛;箨耳卵状椭圆形,边缘有直或曲细缝毛;箨舌截形,低矮,背部粗糙,边缘生短纤毛;箨片小,线状或针锥状,质厚,基部宽为箨鞘顶的 $\frac{1}{2}$,边缘无锯齿。小枝具1或2叶;叶鞘密被棕色细小刺毛;叶耳卵状椭圆形,边缘生缝毛;叶舌截形,极矮,高近1毫米,背部粗糙;叶片较薄,纸质,椭圆状披针形,长约26—35厘米,宽3.5—5厘米,通常多为宽约5厘米,先端较急渐尖,不延伸,基部宽楔形,上表面绿色,下表面灰绿色,两面均无毛,次脉7—10对,边缘无锯齿,惟一边的上部近边缘有2—3行突起的小刺毛;叶柄长3—5毫米。花枝未见。笋期6月。

产江西庐山。生于海拔1000米的山坡和平地的向阳处。模式标本采自庐山植物园。

4. 长鞘茶竿竹 (植物分类学报)


Pseudosasa longivaginata H. R. Zhao et Y. L. Yang in Act. Phytotax. Sin. 20 (2): 217. f. 2. 1982.

竿高1.5—2米,粗5—8毫米,幼竿密被白色或浅黄色绒毛,并覆盖白粉,节下方具浅黄色毛环,越近箨环处则毛越长而密,成熟后色暗;节间长16—26厘米,竿壁薄;竿环稍高于箨环;节内长约4毫米;竿中部以上每节分3枝,竿下部则分1枝。箨鞘质厚,通常长逾其节间,小横脉明显,边缘密生深棕色纤毛,但易脱落;无箨耳和缝毛,但有时具稀疏的缝毛;箨舌截形,高1.5—3.5毫米,边缘呈不规则的波裂和具纤毛;箨片直立,狭小,呈钻形。小枝具1—3叶,下方的叶鞘较长,致使上方的叶片从下方的叶鞘中伸出,边缘生纤毛;叶耳和缝毛均缺;叶舌高1—1.5毫米,截形或拱形,边缘具微齿和纤毛;叶片纸质,椭圆状披针形,长20—47厘米,宽2.7—6.5厘米;先端渐尖呈芒状,基部楔形或一边为钝圆形另一边为楔形,下表面除基部具稀疏长白色毛外,余处无毛,近中脉处决无毛,次脉7—10对,小横脉明显。花枝未见。笋期5月。

产浙江、江西、福建。生于山坡路旁和谷地。模式标本采自福建崇安。

5. 少花茶竿竹 (植物研究)

Pseudosasa pallidiflora (McClure) S. L. Chen et G. Y. Sheng in Bull. Bot. Res. 11 (4): 4. 1991.



图版 193 庐山茶竿竹 *Pseudosasa birta* S. L. Chen et G. Y. Sheng: 1. 部分竿和枝, 示分枝贴竿状; 2. 小枝先端放大; 3. 枝箨先端放大; 4. 箨; 5. 竿箨背面观; 6. 幼竿的节, 示箨鞘基部的毛环; 7. 幼竿的一段, 示表面倒生刺毛。(史渭清绘)