

四川等地。

7. 尖箨茶竿竹 (竹子研究汇刊)

Pseudosasa acutivagina Wen et S. C. Chen in Journ. Bamb. Res. 3 (2): 31. pl. 1984.

竿高 4 米, 粗 25 毫米, 幼竿绿色被白粉, 无毛, 具白色柔毛, 老竿无毛; 节间长达 35 厘米; 竿环平; 箨环具木栓质, 略隆起; 竿每节分 3 枝。箨鞘宿存或迟落, 厚纸质而脆, 长于其节间, 呈狭长三角形, 先端渐尖, 初黄绿色后黄棕色, 背部被较密的棕褐色刺毛, 基部有密集的黄棕色较长刺毛, 边缘生纤毛, 箨耳与鞘口缝毛俱缺; 箨舌弧形隆起, 高约 1 毫米, 边缘生纤毛; 箨片直立, 锥状披针形, 长 1—3 厘米, 无毛。小枝具 2 或 3 叶; 叶鞘长约为节间的 $\frac{1}{3}$, 具纵肋, 初被白色细柔毛, 边缘无毛, 先端歪斜, 无叶耳与鞘口缝毛; 叶舌高约 5 毫米, 质薄, 破碎; 叶片椭圆状披针形至卵状披针形, 长 22—32 厘米, 宽 2—4.5 厘米, 先端渐尖或急尖处伸, 具锐尖头, 基部急尖楔形, 上表面无毛, 下表面被短柔毛, 具小横脉, 两边缘均具锯齿, 次脉 9—11 对; 叶柄长 7—15 毫米。花枝未见。 笋期 6 月。

产浙江。生于海拔 500 米以下的山坡。模式标本采自庆元县关门岙。

本种箨鞘较长, 无箨耳及缝毛, 箨片锥状披针形, 小枝具 2 或 3 叶, 无叶耳和缝毛等与长鞘茶竿竹 *P. longivaginata* H. R. Zhao et Y. L. Yang 相似, 但后者植物矮小, 高 1.5—2 米, 节间长 16—26 厘米, 幼竿密被白色或浅黄色绒毛, 箨鞘具较密的深棕色短刺毛; 箨舌高 1.5—3.5 毫米; 叶鞘较长, 叶片自下一叶鞘伸出, 长 20—47 厘米, 宽 2.7—6.5 厘米, 次脉 7—10 对等特征可以区别。

8. 茶竿竹 (岭南科学杂志) 青篱竹 (中国树木分类学), 沙白竹、亚白竹、厘竹 (广东), 苦竹 (湖南)

Pseudosasa amabilis (McClure) Keng f., Clav. Gen. et Sp. Gram. Prim. Sin. 154. 1957; 中国主要植物图说·禾本科 31 页图 20. 1959. —— *Arundinaria amabilis* McClure in Lingnan Sci. Journ. 10: 6. 1931, desc. Angl. et in ibid. 13: 503. 1934; 陈嵘, 中国树木分类学 82 页, 图 60, 1937; 香港竹谱 21 页. 1985; 中国竹谱 99 页. 1988.

分变种检索表

1. 箨鞘顶端为截形。

2. 箨鞘革质, 坚硬; 小穗的颖和稃片均密被微毛 8a. 茶竿竹 var. *amabilis*

2. 箨鞘质地较薄; 小穗的颖和稃片均被厚白粉而所被毛茸较少乃至几无毛

..... 8b. 厚粉茶竿竹 var. *farinosa* C. S. Chao

1. 箨鞘顶端在两侧隆起。