

9 毫米, 宽 3 毫米, 先端钝圆, 2 脊之间有 2 脉, 脊外至两侧各有 1 脉, 外面密被细柔毛, 脊上具纤毛; 鳞被 3, 长 1.5—2 毫米, 先端边缘生纤毛; 子房棒状无毛, 花柱与子房等长, 被粗毛, 柱头 3, 树枝状; 成熟果实未见。笋期 6 月。

产浙江平阳县天井乡 (模式标本产地)。

竹材可编制小农具。

12. 长舌茶竿竹 (南京大学学报) 绿笛竹 (湖南)

Pseudosasa nanunica (McClure) Z. P. Wang et G. H. Ye in Journ. Nanjing Univ. (Nat. Sci. ed.) **1981** (1): 97. 1981. — *Indocalamus nanunicus* McClure in Lingnan Univ. Sci. Bull. No. **9**: 25 1940. — *Arundinaria nanunica* (McClure) C. D. Chu et C. S. Chao in Journ. Nanjing Techn. Coll. For. Prod. **1980** (3): 26. 1980.

12a. 长舌茶竿竹 (原变种)

var. *nanunica*

竿直立, 高达 4 米, 粗约 1 厘米, 节下方被白粉, 后变黑色, 幼竿具绒毛和白粉, 尤以节下方更显著; 节间劲直, 绿黄色, 圆筒形, 光滑, 因密集的白色粉逐渐变黑而呈斑状; 笋环凸起; 箨环明显, 常有箨鞘残留的木栓质纤维; 节内长约 10 毫米。竿下部每节仅分 1 枝, 但中上部则分 3 枝或更多, 枝开始紧贴竿, 然后稍开展, 无二级分枝, 各枝粗细近相等。箨鞘近宿存, 淡褐紫色, 较厚的纸质, 背部密被白色短绒毛或浅棕色较长的刺毛, 具明显或不太明显的斑点, 边缘具密的短纤毛; 无箨耳和繸毛; 箨舌甚高, 自箨鞘顶端延伸, 中下部竿箨的箨舌高可达 7—9 毫米, 箨舌背面在其中下部具绒毛而粗糙, 顶端截平或拱形, 边缘具短纤毛; 箨片直立, 绿带紫色, 线状披针形, 两面均粗糙, 边缘具疏刺状锯齿。小枝具 2—4 叶; 叶鞘厚纸质, 具纵肋, 背部突起成脊, 密被细绒毛或近于无毛乃至平滑无毛, 边缘具易脱落的短纤毛, 以致通常为无毛; 无叶耳和繸毛; 叶舌较长, 常成为自叶鞘向上延伸呈三角状的突起, 高达 5—14 毫米, 薄纸质, 下部质较厚, 背面基部具微毛而粗糙, 顶端尖状隆起或钝尖, 边缘全缘, 具短纤毛; 叶片椭圆形或长椭圆形, 先端短渐尖, 基部多少偏斜, 其一边楔状渐尖, 另一边钝圆, 上表面绿色, 无毛光滑, 下表面苍白色, 具较密的向上的细毛和极细疣, 边缘均具疏细齿, 次脉 9—12 对, 小横脉明显。叶柄长约 1.5 厘米。花枝未见。 笋期 4 月底。

产湖南南部、广东。生于海拔 400 米的山坡、平原、谷地近河边。模式标本采自广东清远。

本种外形极似茶竿竹 *P. amabilis* (McClure) Keng f. 惟后者笋棕色, 淡咖啡色, 箨背密被长的刺毛, 箨舌, 叶舌矮, 易与本种区别。

12b. 狭叶长舌茶竿竹 (变种) (植物研究) 图版 196

var. *angustifolia* S. L. Chen et G. Y. Sheng in Bull. Bot. Res. **11** (4): 5, 1991.

与原变种的主要区别为本变种叶片狭小, 长 6—20 厘米, 宽 1—3 厘米, 叶柄长 2—