

Chao et G. G. Tang in Journ. Nanjing Instit. For. **1985** (4); 14. f. 1. (1—2) 1985. — *Bambusa fortunei* Van Houtte in Fl. Serr. Jard. **15**: 69. t. 1535. 1863. — *B. variegata* Sieb. ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. -Bat. **2**: 285. 1866. — *B. picta* Sieb. et Zucc. ex Munro in Trans. Linn. Soc. **26**: 111. 1868, pro syn. sub *B. fortunei* Van Houtte. — *Arundinaria fortunei* (Van Houtte) Riv. in Bull. Soc. Acclim. III, **5**: 797. 1878; Mitf. Bamb. Gard. p. 102. 1896. — *A. variabilis* Makino ex vilm. var. *fortunei* (Van Houtte) H. de Leh. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **16**: 226. 1907. — *Sasa variegata* (Sieb. ex Miq.) E. G. Camus, Bambus. p. 21. 1913; R. A. Young in Nat. Hort. Mag. **24**: 180. , f. (in p. 181). 1945. — *Pleioblastus variegatus* (Sieb.) Makino in Journ. Jap. Bot. **3**: 23. 1926 “variegata”; Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed. 2. 1379. 1933. “variegata”; — *P. fortunei* (Van Houtte) Nakai in Journ. Jap. Bot. **9**: 232. pl. 30. 1933; S. Suzuki, Ind. Jap. Bambusac. **10**, 24 (f. 126) 320, 321. (pl. 126), 370. 1978; 中国竹谱 92 页. 1988.

竹鞭粗约 1—2 毫米；竿高 10—30 厘米，高大者可达 50—80 厘米；节间细而短小，圆筒形，直径 1—2 毫米，光滑无毛；竿环较平坦或微有隆起；竿不分枝或每节仅分 1 枝。箨鞘宿存，无毛。小枝具 4—7 叶；叶鞘无毛，鞘口缝毛白色并不粗糙；叶片短小，披针形，长 6—15 厘米，宽 8—14 毫米，先端渐尖，基部宽楔形或近圆形；两面均具白色柔毛，尤以下表面较密，叶面通常有黄色或浅黄色乃至近于白色的纵条纹。

江苏和浙江等省有栽培，为城市公园或庭园的良好观赏竹种，也可用来制作盆景。模式标本可能采自日本。

7. 翠竹 (南京林学院学报)

Sasa pygmaea (Miq.) E. G. Camus, Bambus. **22**. pl. 5, f. B. 1913. — *Bambusa pygmaea* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. -Bat. **2**: 286. 1866; Mitf., Bamb. Gard. **112**. 1896. — *Arundinaria pygmaea* (Miq.) Mitf., ibid. **49**. 1896, in textu; (Miq.) Aschers. et Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. **2**: 773. 1902. — *Pleioblastus pygmaeus* (Miq.) Nakai in Rika Kyoiku (理科教育) **15**: 70. 1932. et in Journ. Jap. Bot. **9**: 234. pl. 31. 1933; S. Suzuki, Ind. Jap. Bambusac. **310**, 311 (pl. 121), 369. 1978. — *Nipponocalamus pygmaeus* (Miq.) Nakai in Journ. Jap. Bot. **18**: 362. 1942.

7a. 翠竹 (原变种)

var. *pygmaea*

竿高 20—40 厘米，直径 1—2 毫米，竿箨及节间无毛，节处密被毛。叶密生、二行列排列；叶鞘有细毛；叶耳不发达，鞘口缝毛白色、平滑；叶片线状披针形，长 4—7 厘米，宽 7—10 毫米，纸状皮质，叶基近圆形，先端略突渐尖或为渐尖，上表面疏生短毛，下表面常在一侧具细毛。