

3 脉,先端具芒尖,第二颖通常具 5 脉,小横脉明显,先端亦具芒尖;内稃具 2 脊,被短柔毛,长为外稃的 1/4 (未发育)。果实未见。 笋期 7—8 月,花期 8 月中旬。

产四川东部。海拔 1 600—1 900 米。模式标本采自丰都县七耀山林场冷箐山丫口。叶可作斗笠、包粽子。

3. 具耳箬竹 (植物分类学报)

Indocalamus auriculatus (H. R. Zhao et Y. L. Yang) Y. L. Yang in Journ. Nanjing Univ. (Nat. Sci. ed.) **26** (2): 282. 1990. — *I. hispidus* H. R. Zhao et Y. L. Yang var. *auriculatus* H. R. Zhao et Y. L. Yang. in Act. Phytotax. Sin. **23** (6): 461. 1985.

笋高 0.5—2.5 米,粗 2—7 毫米,全笋 8—15 节;节间圆筒形,最长可达 25 厘米,最短为 6—8 厘米,鲜时绿色,微被白粉,有黄棕色的疣基刺毛,尤以节之下方较密,毛脱落后留有凹痕,笋壁厚 1—2 毫米;笋环稍隆起;箨环略平,箨环下方有一圈灰白色或灰褐色污粉。箨鞘短于节间,厚革质,紧抱笋,幼时墨绿色老时枯草色,密被黄褐色刺毛;箨耳镰形,鞘口缝毛显著;箨舌高 0.5—1 毫米,截平形;箨片直立或外翻,线状披针形,长 0.5—2.8 厘米。枝箨的箨耳亦作镰形。叶耳无,鞘口缝毛显著,但易脱落;叶舌高 1—1.5 毫米。叶柄长 6—11 毫米;叶片长椭圆形,先端尾尖,基部楔形或近圆形,长 20—29 厘米,宽 3.5—6.5 厘米,干时呈波状曲皱,尤以幼叶为甚,上表面无毛,下表面灰绿色,被伏贴微毛,次脉 6—14 对,小横脉呈方格状。圆锥花序虽已见到但未成熟,暂不描述。 笋期 5—6 月,花期 8—10 月。

产四川万源、筠连、通江等处。生于海拔 1 400—2 400 米山地。模式标本采自万源八台山。

组 2. 箬竹组 Sect. *Indocalamus*

叶片在干燥后不作波浪状的皱折,叶舌高在 4 毫米以下;分布地区广泛多在低海拔 (1 000 米以下)丘陵和平原,但峨眉箬竹 *I. emeiensis* 可生于 1 200 米,箬竹 *I. tessellatus* 及巫溪箬竹 *I. wuxiensis* 分布高可达 1 400 米或更高,为例外。

模式种:水银竹 *Indocalamus sinicus* (Hance) Nakai

本组所含种类较多,我国已知有 19 种,分布在长江流域及以南广大地区。

4. 矮箬竹 (中国主要植物图说·禾本科) 矮苦竹 (中国竹类植物志略) 图版 209

Indocalamus pedalis (Keng) Keng f. in Techn. Bull. Nat'l. For. Res. Bur. China. No. **8**: 12. 1948. 竹类经营 63 页,图 41. 1957; 中国主要植物图说·禾本科 19 页,图 10. 1959; 竹的种类及栽培利用 175 页,图 64. 1984. — *Arundinarius pedalis* Keng in Journ. Wash. Acad. Sci **36** (3): 84. f. 3. 1946.

笋高 30 厘米左右,直径 2 毫米;下部节间长 1—5 厘米。箨鞘长 2—4.5 厘米,有纵肋,无毛;箨耳无;箨舌截形,质坚,高约 0.3 毫米,边缘无毛。小枝有 2—4 叶;叶鞘