

带紫色，背部密被棕色伏贴疣基刺毛；箨耳无或微弱，存在时疏生粗糙的缝毛；箨舌高 0.7—1.8 毫米，背部有短毛，边缘疏生粗糙的纤毛；箨片直立，线状披针形。叶耳无；叶舌高 1—2 毫米，边缘有灰色纤毛；叶柄长 0.5—0.7 厘米；叶片长椭圆状披针形，长 19—34 厘米，先端尾尖，宽 4.5—7 厘米，两面无毛，惟在下表面近基部处有时具毛，次脉 9—12 对，小横脉呈方格状。花序未见。 笋期 4 月上中旬。

产江西瑞金拔英林场路边（模式标本产地）。

11. 胜利箨竹（植物分类学报） 图版 209: 2, 3

*Indocalamus victorialis* Keng. f. in Techn. Bull. Nat'l. For. Res. Bur. China No. 8; 12. 1948. nom. nud. et in Act. Phytotax. Sin. 1 (1): 121. pl. 7. 1951; 竹类经营 61 页. 图 39. 1957; 中国主要植物图说·禾本科 17 页. 图 9. 1959.

笋高 1—3 米，粗 5—8 毫米；节间细长，圆筒形，最长可达 26 厘米，有纵肋而无毛，空腔直径为 1—2 毫米；笋环较隆起；箨环平坦；节内长 4—5 毫米；笋每节分 1 枝，枝条贴生，惟笋上部稀可分 3 或 4 枝，枝与笋之腋间具有先出叶，枝基部还具少数逐渐增长的枝鞘。箨鞘远较节间为短，革质兼厚纸质，紧紧抱笋，被以淡棕色伏贴疣基刺毛，后者脱落后留存疣基，此外鞘基部还密生有向下的棕色疣基刺毛，边缘密生纤毛；箨耳无；箨舌高 0.5—1 毫米，截形，背部具微毛；箨片细长形，无毛，早落性。小枝具 1—4 叶；叶鞘除边缘的上部生有纤毛外，余处均无毛，长 3—8.3 厘米，背部具脊；叶耳无；叶舌长约 0.5 毫米，截形，背面被微毛；叶片宽披针形，纸质，长 14—25 厘米，宽 2.5—4 厘米，两面均无毛，先端渐尖呈细尾状尖头，基部阔楔形向下延伸成短叶柄，上表面绿色，下表面灰绿色，次脉 5—9 对，小横脉形成长方格状。圆锥花序人形，长 15—26 毫米，每节 1—3 分枝，枝腋有瘤枕；小穗柄粗短，长 1—5 毫米，具短毛；小穗含小花 5 朵，长约 1 厘米，黄绿色；小穗轴扁平，具微毛，其节间长约 2 毫米，易折断；颖无毛，但中脉上部具微毛，第一颖披针形，长 3.5—5 毫米，先端渐尖，淡紫色，3 脉，第二颖长 5.5—6 毫米，黄绿色，具不明显的 3 脉而中脉突起，表面上部被微毛而粗糙；外稃窄披针形，长 5—6 毫米，宽约 2 毫米，厚纸质，先端渐尖，黄绿色，除一缘有细纤毛外，余处均无毛，具 7 脉，基盘具有长为 0.5—1 毫米之短毛；内稃长 4.5—5.5 毫米，背部具 2 脊，脊上无毛，但于脊间之顶端生有微毛，边缘呈膜质；鳞被膜质，后方 1 片呈长圆形，长 1 毫米，宽 0.4 毫米，先端钝圆，疏生短纤毛，两侧的 2 片呈长圆柱卵形，长 1 毫米，宽 0.3 毫米，先端尖锐，全缘；花药淡黄色，长约 4 毫米，药室的上下两端均微有叉分；花丝细弱，长约 2 毫米；子房窄长圆形，长约 0.8 毫米，棕色，无毛；花柱 2，极短，柱头羽毛状，长约 2 毫米；果实未见。 花期 5 月，笋期 4 月。

产四川。生于山谷内慈竹丛间或开敞的山坡上。模式标本采自重庆歌乐山。

12. 水银竹（竹类培育） 华箨竹（香港竹谱） 图版 212: 1—7

*Indocalamus sinicus* (Hance) Nakai in Journ. Arn. Arb. 6: 148. 1925; 香港竹谱



图版 209 1. 矮箬竹 *Indocalamus pedalis* (Keng) Keng f. 开花植株。2, 3. 胜利箬竹 *Indocalamus victorialis* Keng f. 2. 竿上部, 示分枝及叶片; 3. 花枝。(蔡淑琴绘)