

65 页. 1985; 中国竹谱 105 页. 1988. — *Arundinaria sinica* Hance in Ann. Sci. Nat. IV. 18: 235. 1862; Rendle in Journ. Linn. Soc. 36: 436. 1904; E. G. Camus, Bambus. 47. 1913. “sinicica” — *A. longiramea* Munro in Trans. Linn. Soc. 26: 19. 1868.

竿高 1—3.8 米, 直径 0.5—1.1 厘米; 节间长 3.7—11 厘米, 圆筒形, 鲜时绿色, 干时稻草色, 无毛, 光亮, 竿壁厚 3—4 毫米; 竿节平; 竿环和箨环同高。箨鞘短于或长于节间, 革质兼纸质, 棕色带紫, 有条纹和疏被伏贴白色和无色的疣基刺毛, 边缘密生亮灰色纤毛; 无箨耳, 但有数条鞘口缝毛; 箨舌截形, 棕红色, 高 1—1.4 毫米, 边缘有流苏状缝毛, 后者长 0.7—0.9 毫米, 中部竿箨的箨片呈狭三角状锥形, 上部箨的则为卵状披针形, 直立或外翻, 先端长尖。小枝具 7—14 叶; 叶鞘棕黄色, 革质, 无毛, 有光泽; 叶耳无, 鞘口缝毛仅数根, 黄棕色; 叶舌截形, 高 2—3 毫米, 红褐色, 边缘有棕色长 1.6 厘米的缝毛; 叶片革质, 宽披针形, 长 14—60 厘米, 宽 2.2—6.8 厘米, 先端长尖, 基部楔形, 通常两面均无毛, 次脉 8—9 对, 小横脉稀疏, 形成极狭长的长方形且很稀疏。圆锥花序的花序轴较长, 全长 23.5—30 厘米或更长, 分枝甚开展, 其腋间均有瘤枕; 小穗柄长 2—6 厘米; 小穗绿色带紫, 含 3 或 4 朵小花; 小穗轴节间无毛; 颖 2, 第一颖长圆状披针形, 微尖, 长 4.5—5 毫米, 纸质, 具 3 脉; 第二颖长 5—6.5 毫米, 先端渐尖, 具 5 脉; 外稃纸质, 渐尖, 长 9—10 毫米, 背部粗糙, 具 7 脉; 内稃略等长于外稃, 背部具 2 脊, 脊上和顶端均有纤毛。鳞被 3, 不相等, 其中 2 片较大。雄蕊未见; 花柱短, 柱头 2。果实未见。花期 5 月。

产香港、广东(阳江)、海南(保亭县吊罗山)等地。生于河边、山坡、山谷、岭顶密林中。模式标本采自香港。

### 13. 锦帐竹(竹类培育)假华箬竹(海南植物志)

*Indocalamus pseudosinicus* McClure in Sunyatsenia 6: 37. pl. 8. 1941; 海南植物志 4: 351 页. 图 1167. 1977.

13a. 锦帐竹(原变种) 图版 212: 8—12

#### var. *pseudosinicus*

竿高 1.5—2 米, 直径 3—6 毫米; 节间无毛或具白粉和微毛, 节下方有一圈淡棕色贴生毛环; 竿壁厚 1.5—2.5 毫米; 竿环较箨环为高; 节内长 6.5—7 毫米。箨鞘长 7—10 厘米, 紧密抱竿, 长为节间的  $\frac{1}{2}$ , 干时呈稻草色, 无毛而有纵肋; 箨耳无; 箨舌甚低, 高 0.3—1 毫米, 弧形; 箨片基部向内收窄, 抱竿。小枝具 5—7 叶; 叶鞘具隆起纵肋, 背面向下部光亮, 上部近边缘处生有伏贴棕色疣基刺毛或无毛, 边缘有棕色纤毛; 叶耳无, 叶舌高 0.5—1.5 毫米, 边缘有长 2.6—3 厘米的波状棕色缝毛; 叶片长 19—38.5 厘米, 宽 2.6—4.6 厘米, 长圆状披针形, 先端渐狭状渐尖, 基部楔形, 无毛或下表面可生稀疏伏贴的短硬毛, 两边边缘具微锯齿; 次脉 10—11 对, 小横脉形成较长的长格状。圆锥花序生于有叶或无叶的枝条上, 长约 26 厘米, 直立, 花序轴无毛或具明显棱角, 分枝细长,