

形成正方格而非长方格形。

产湖北、湖南和广西等省区。生于山坡路旁。模式标本采自湖南永州市阳明山林场。

17. **峨眉箬竹** (植物分类学报) 图版 214: 1—3

Indocalamus emeiensis C. D. Chu et C. S. Chao in Act. Phytotax. Sin. 18(1):25. f. 1. 1980.

竿高 1.5 米, 粗约 8—10 毫米; 节间长约 30 厘米, 中空, 竿壁厚 0.12—0.2 毫米, 幼时贴生有白色短硬毛, 其上部具红棕色倒毛。箨鞘长不及节间之半, 褐色, 间有稻草色大小不等的斑点, 密被棕色向下的疣基刺毛, 毛脱落后还留存疣基, 边缘生褐色纤毛; 箨耳发达, 呈新月形, 长约 6—7 毫米, 繸毛放射状伸展, 其长为 1—2 厘米; 箨片三角状披针形, 不抱竿; 箨舌宽为箨片基部的 2 倍, 高约 1 毫米, 先端具粗纤毛。每小枝具 4—10 叶; 叶鞘被白色短柔毛和红棕色疣基刺毛, 毛脱落后在叶鞘表面留存有疣基, 边缘生纤毛; 叶耳发达, 亦呈新月形, 繸毛作放射状伸展, 后者长 2—3 厘米; 叶舌短矮, 先端具发达的长为 2.5—3 厘米之流苏状繸毛; 叶片长圆状披针形, 长 16—40 厘米, 宽 3.5—6.5 厘米, 先端渐尖, 基部楔形, 渐收缩成叶柄, 叶片常多少有些两侧不对称, 无毛, 下表面粉绿色, 次脉 7—11 对, 小横脉形成长方格状, 在叶片两面都很明显, 叶缘生有向上的细锯齿而粗糙。花枝未见。

产四川峨眉山洪椿坪, 海拔 1 200 米 (模式标本产地)。


18. **髯毛箬竹** (植物分类学报) 图版 214: 4

Indocalamus barbatus McClure in Sunyatsenia 6: 32. 1941; 广西竹种及其栽培 91 页, 图 49. 1987.

竿高约 1.5 米, 直径 5—10 毫米; 节间长 25—35 (45) 厘米, 实心, 幼时密被棕色伏贴疣基刺毛; 箨环较平坦, 其周围有箨鞘基部的残留物, 竿环隆起; 节内长 9—10 毫米。箨鞘长约为节间的 $1/2—1/3$, 绿色, 背部密被淡棕色疣基长毛; 箨耳极发达, 镰形, 长 1.5—2 厘米, 边缘密生两行放射状伸展的繸毛, 后者长 2—3 厘米; 箨舌高 0.5—1 毫米, 截形或微凹, 边缘密生流苏状繸毛, 其长为 2—3 厘米; 箨片椭圆状披针形, 绿色, 向上逐渐增大。小枝具 5—8 叶; 叶鞘厚硬, 背部密被疣基长毛, 以后逐渐变为无毛而留有疣基, 通常上部还密被白色柔毛; 叶耳较厚, 极发达, 长 15 毫米, 宽约 3 毫米, 其边缘生有长达 3 厘米呈放射状伸展的疣基繸毛, 叶舌高约 2 毫米, 边缘密生直立流苏状繸毛, 后者长 2—2.5 厘米; 叶片椭圆状卵形、椭圆形或椭圆状披针形, 长 15—35 (40) 厘米, 宽 5—9 (12) 厘米, 先端渐尖呈锥状粗糙尖头, 基部宽楔形, 上表面无毛, 下表面沿叶脉被短粗毛, 次脉 8—12 对, 小横脉形成较为稀疏的长方格形。花序未见。 笋期春夏。

产广西金秀县大瑶山 (模式标本产地)。海拔 500 米, 生于常绿阔叶林内。

竿可作筷子和毛笔杆等, 叶片可作斗笠, 船篷等的衬垫材料。



图版 214 1-3. 峨眉箬竹 *Indocalamus emeiensis* C. D. Chu et C. S. Chao; 1. 竿的一部分，示笋箨（箨片已落）以及包在笋鞘内的分枝；2. 叶枝；3. 叶片的一部分放大，示形成长方形的小横脉。

4. 髯毛箬竹 *Indocalamus barbatus* McClure; 叶枝的一部分，示叶片背面及大形叶耳。

（蔡淑琴绘）