

- 毫米, 叶鞘颈部具柔毛 3. 类芦 *N. reynaudiana* (Kunth) Keng ex Hitchc.
 3. 秆高约 1 米; 叶片长约 20 厘米, 宽 2—4 毫米, 小穗含 2—3 花, 长约 4 毫米, 外稃长 2—3 毫米
 4. 梵净山类芦 *N. fanjingshanensis* L. Liu

1. 大类芦 (拟)

Neyraudia arundinacea (L.) Henr. in Meded. Rijks. Herb. Leiden no. 58: 8. 1929; Bor, Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 518. 1960; Fl. E. Himal. 121. 1975. — *Aristida arundinacea* L. Mant. Pl. Alt. 186. 1771. — *Arundo madagascariensis* Kunth, Rev. Gram. 1: 272. t. 48. 1830. — *Neyraudia madagascariensis* (Kunth) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 7: 305. 1896.

多年生, 具短根状茎。秆苇状, 高 3 米左右, 直径约 1 厘米。叶片长达 60 厘米, 宽约 10 毫米, 先端丝形, 常内卷粗糙。圆锥花序稠密, 长 40—70 厘米, 宽约 10 厘米, 亮褐色; 小穗含 5—7 小花, 长 6—9 毫米; 第一颖长 2.2—3 毫米, 第二颖长 2.6—3.2 毫米; 第一小花正常发育, 外稃披针形, 长 3.5—4.5 毫米, 具 3 脉, 边脉具长约 2 毫米的开展白柔毛, 先端 2 裂, 齿长 0.5—1 毫米, 其间伸出长约 2 毫米反曲的短芒, 基盘长圆形, 长 0.2—0.4 毫米, 花药长 1.8 毫米。染色体 $2n = 20$ (Bir et Sahni 1986)。

产云南南部墨江。生于山麓河谷地带, 海拔 700—1200 米以下。分布于非洲 (马达加斯加)、热带亚洲、印度、巴基斯坦、尼泊尔。模式标本采自印度。

2. 山类芦 (禾本科图说) 图版 4: 6

Neyraudia montana Keng, Sinensia 6: 151, fig. 4. 1935; 中国主要植物图说·禾本科 339, 图 279. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 49. 1976.

多年生, 具向下伸展的根状茎。秆高约 1 米, 密丛型, 径 2—3 毫米, 具 4—5 节。叶鞘短于其节间, 上部者平滑无毛, 基部者密生柔毛, 枯萎后宿存于秆基; 叶舌长约 2 毫米, 密生柔毛; 叶片内卷, 长 50—60 厘米, 宽 5—7 毫米, 上面有柔毛。圆锥花序长 25—60 厘米, 分枝微粗糙, 长约 20 厘米, 斜升; 小穗长 7—10 毫米, 含 3—6 小花; 颖具 1 脉, 顶端渐尖或呈锥状, 第一颖长 4 毫米, 第二颖长约 5 毫米; 外稃具 3 脉, 长 5—6 毫米, 近边缘生短柔毛, 顶端有短芒, 芒长 1—2 毫米, 基盘具长约 2 毫米的柔毛; 内稃稍短于其外稃。花药长约 1.5 毫米。

产江西、浙江、安徽。生于山坡路旁, 海拔 500—1100 米。模式标本采自江西庐山。

3. 类芦 (种子植物名称) 假芦 (钟观光拟) 图版 4: 5, 5a

Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc. in Amer. Journ. Bot. 21: 131. 1934; Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 10: 265. 1941; Hitchc. Man. Grass. Univ. Stat. 190. f. 254. 1951; Bor, Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 518. 1960; Hsu in Fl. E. Himalaya 369. 1966, et Taiwaniana 16: 225. 1971; 中国主要植物图说·禾本科 330,