

毫米；外稃长3.8—4毫米，脊与边脉下部生柔毛，基盘有多量绵毛；内稃稍短，两脊粗糙。花药长约0.8毫米。花果期6—7月。染色体 $2n=70$ (Sokolovskaya et Probato-va 1976)。

产山西(五台山)。生于林缘、灌丛路旁，海拔2600米。分布于俄罗斯(西伯利亚、远东)、蒙古、日本。模式标本采自俄罗斯。

60. 朗坦早熟禾(拟)

Poa langtangensis Meld. in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal. 1: 143. 1978.

多年生，具细弱匍匐根状茎。秆疏丛生，高10—25厘米，纤细，直立。叶鞘平滑无毛；叶舌长0.5—1.2毫米；叶片扁平或对折，长2—5厘米，宽1—2毫米，脉细弱，平滑，分蘖叶狭窄，内卷。圆锥花序长3—5厘米，疏松开展；分枝孪生，长1—3厘米，纤细平滑，开展或反曲；小穗长3—3.5毫米，含2小花，带紫色；颖上部边缘膜质，脉不明显，第一颖长1.5—2毫米，具1脉，披针形，顶端尖，第二颖长2—2.5毫米，较宽，具3脉；外稃长圆形，先端尖，5脉不明显，脊和边脉下部具纤毛，脉间无毛，基盘有丰富绵毛，第一外稃长2.5—3毫米；内稃两脊上部微粗糙；花药紫色，长约1.5毫米。花期6月。

产西藏。生于高山河谷草地，海拔4000米。分布于尼泊尔。模式标本采自尼泊尔中部。

61. 台湾早熟禾(台湾的禾草)

Poa formosae Ohwi in Rep. Spec. Nov. Regn. Veg, 36 (1—6): 41. 1932; Fedde Repert. Sp. Nov. 36: 41. 1934; 台湾的禾草 338. 1975; 台湾植物志 5: 451. 1978.

多年生，具短匍匐茎。秆疏丛，高50—60厘米，径约2毫米，具2—3节。叶鞘具倒向微粗糙或平滑，顶生者长于其叶片；叶舌长1—2毫米；叶片扁平，长8—15厘米，宽2—4毫米，质柔软，先端渐尖，上面微粗糙。圆锥花序长15—20厘米，疏松开展，分枝3—4枚生于各节，长4—8厘米，粗糙，中部以上着生数枚小穗；小穗绿色，含3—5小花，长4—5毫米，宽约3毫米；颖不相等，先端尖，微糙涩，第一颖长约2毫米，具1脉，第二颖长3毫米，具3脉；外稃长3—3.5毫米，边缘狭膜质，脊下部2/3贴生柔毛，边脉仅基部有柔毛，基盘具绵毛；内稃稍短，两脊除基部外微粗糙；花药长约1毫米。花期5—6月。

产台湾。生于山坡草地。模式标本采自台湾宜兰南湖大山。

62. 粉绿早熟禾(拟)

Poa pruinosa Korotki in Fedde Repert. Sp. Nov. 13: 291. 1913—1915; Roshev. in Kom. Fl. URSS 2: 394. 1934.

多年生。植株具匍匐茎，粉绿色，高20—70厘米，细瘦无毛。叶舌长约0.5毫米；叶片对折，宽3—5毫米。圆锥花序长圆形，长5—10厘米；分枝4—5枚簇生各节，平