

2700—4100 米。模式标本采自云南丽江。

70. 高砂早熟禾 (台湾的禾草)

Poa takasagomontana Ohwi in Fedde Repert. Sp. Nov. **36**: 41. 1934; Hsu in *Taiwania* **16**: 244, 1971; 台湾的禾草 339, 图 65. 1975; 台湾植物志 **5**: 450. 1978.

多年生。秆细弱，丛生，高 40—50 厘米，径约 0.4 毫米；叶舌长约 1 毫米，顶端尖；叶片扁平，长 10—15 厘米，宽 1—1.5 毫米。圆锥花序稀疏开展，长约 10 厘米，具少数长 1—2 厘米的粗糙分枝，分枝上部着生 2—4 枚小穗；小穗常含 2 花，长约 3.5 毫米；颖纸质，脊粗糙，第一颖窄披针形，长约 1.5 毫米，具 1 脉，第二颖长约 3 毫米，具 3 脉；外稃具 5 脉，中脉下部具纤毛，侧脉无毛，基盘有绵毛，第一外稃长 3—3.5 毫米；内稃窄披针形，长约 3 毫米；花药长约 1 毫米。颖果长约 1.5 毫米。花果期 7—8 月。

产台湾 (台中、宜兰、雪山)。生于高山林缘潮湿处。模式标本采自台湾新州高砂山。

本种与宜兰早熟禾 *Poa taiwanicola* 相近，区别为小穗小，第一颖窄小，仅具 1 脉；外稃侧脉几无纤毛。

71. 石生早熟禾 (禾本科图说) 图版 19: 5

Poa lithophila Keng ex L. Liu, in *Addenda*; 中国主要植物图说·禾本科 209, 图 163. 1959; 横断山区维管植物 **2**: 2185. 1994; sine latin. descr..

多年生，具根头。秆疏丛生，高约 50 厘米，径约 1 毫米，细弱，膝曲上升，具 2 节；叶鞘下部闭合，平滑无毛；顶生者长约 8 厘米，长于其叶片；叶舌长 0.2—0.8 毫米，边缘有钝齿；叶片狭线形，先端渐尖，长 4—8 厘米，宽 1—2 毫米，上面沿脉微粗糙，茎生者长 30 厘米左右，扁平或边缘内卷。圆锥花序极疏松开展，长与宽均为 8—10 厘米，每节具 2—4 分枝，分枝中部以上生小枝，顶生 1—2 小穗，基部主枝长约 4 厘米，细弱下垂，平滑，带紫色；小穗长 5—6 毫米，含 2—3 小花，紫色；颖顶端与边缘狭膜质，第一颖长 2—2.5 毫米，具 1 脉，第二颖长 3—3.5 毫米，脊上微粗糙；第一外稃长 4—4.5 毫米，先端与边缘膜质，间脉明显，脊下部 1/3 及边脉基部具短柔毛，基盘具少量绵毛；内稃与外稃等长，先端渐尖，脊上部具短纤毛，下部 1/3 平滑；花药长约 2 毫米。花期 6—7 月。

产云南西北部、四川西北部、西藏。生于高山栎林、落叶松和松林下、云杉林缘、砾石间湿润草地与河漫滩上，海拔 2800—4300 米。模式标本采自四川德格。

72. 细秆早熟禾 (台湾的禾草)

Poa tenuicula Ohwi in Fedde Repert. Sp. Nov. **36**: 42. 1934; Hsu in *Taiwania* **16**: 244. 1971; 台湾的禾草 341, 图 66. 1975; 台湾植物志 **5**: 450, 1978.

多年生丛生草本。秆直立，高 20—30 厘米，具 2 节，顶节位于秆下部 1/4 处。叶