

脊上部稍粗糙，第一颖长 2—3 毫米，具 1 脉，第二颖长 3—4 毫米，具 3 脉；外稃长圆形，边缘与顶端具窄膜质，带紫色，间脉尚明显，脊上部粗糙，下部 1/3 及边脉基部具柔毛，基盘不具绵毛或稀少；第一外稃长 3.5—4 毫米；内稃等长或稍短于外稃，脊上粗糙；花药长约 2 毫米。 花果期 7—9 月。

产四川（德格）、西藏东南部（贡觉、类乌齐、洛隆）。生于山坡草地及灌丛林缘，海拔 3200—4500 米。模式标本采自四川德格。

78. 大序早熟禾（拟）

Poa major D. F. Cui in Acta Bot. Bor. Occ. Sinica 7 (2): 83, 图 1. 1987; 新疆植物志 6: 104, 图版 38: 1—5. 1996.

多年生，疏丛。秆直立，高 60—90 厘米，带紫褐色，顶节位于秆的 1/3 以上。叶鞘短于其节间，平滑无毛，基部叶鞘紫色；叶舌长 0.5 毫米；叶片扁平，宽 2—3 毫米，上面粗糙。圆锥花序长 10—20 厘米，疏松，分枝下部长裸露，粗糙，1—3 枚着生于各节；小穗卵圆形，含 5—7 小花，长 6—7 毫米；颖披针形，先端尖，第一颖长 4—4.5 毫米，具 1 或 2—3 脉，第二颖长 4—5.5 毫米；外稃披针形，顶端尖有膜质，脊和边脉 1/3 以下具长柔毛，基盘无绵毛，第一外稃长 4—4.5 毫米；内稃长 3.5—4 毫米，两脊具纤毛；花药紫色，长 2—2.5 毫米。 花期 7—9 月。

产新疆（新源、尼克苏）。生于山地草甸，海拔 2400 米。模式标本采自新疆新源。

79. 伊尔库早熟禾（拟）

Poa ircutica Roshev. in Bot. Mat. (Leningrad) 3: 91. 1922; Roshev. in Kom. Fl. URSS 2: 387. 1934; Probat., Nov. Sist. Vyssh. Rast. 10: 9. 1973; Tzvel. in Fed. Poac. URSS 460. 1976.

多年生，具匍匐茎。秆倾卧上升，高 50—80 厘米。叶鞘平滑无毛；叶舌长约 2 毫米；叶片扁平，宽 5（—7）毫米。圆锥花序金字塔形，长约 15 厘米，分枝具少数小穗，长裸露；小穗紫色，含 4—5 小花，长 5—6 毫米，宽约 3 毫米；第一颖狭窄，具 1 脉，先端渐尖，长 3—3.2 毫米，第二颖宽长约 4 毫米，具 3 脉；外稃长约 4 毫米，一侧宽约 2 毫米，脉明显，脊与边脉下部具微柔毛，基盘无绵毛。 花期 7—8 月。

产东北。生于亚高山草甸。分布于俄罗斯东西伯利亚。模式标本采自俄罗斯西伯利亚。

80. 福克纳早熟禾（拟）

Poa falconeri Hook. f. in Fl. Brit. Ind. 7: 342, 1896; Bor in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 51: 68, fig. 23. 1952.

多年生。秆较粗壮，高约 70 厘米。叶鞘平滑无毛；叶舌长达 4 毫米；叶片扁平，长 10—20 厘米，宽约 4 毫米，边缘或两面粗糙，顶生叶片长于其叶鞘。圆锥花序狭窄，长 8—12 厘米，具少数分枝与小穗，疏松下垂；分枝 1—2 枚着生于下部各节，再分小