

脉中部以下具短柔毛，基盘有绵毛，第一外稃长 2.5—3 毫米；内稃较短于外稃，脊上部微粗糙；花药小，长 0.3—0.4 毫米。花期 6—8 月。

产西藏西部。生于高山冰碛石缝中，海拔达 5500 米。模式标本采自西藏仲巴。

本种与大颖早熟禾 *P. macrolepis* Keng 有亲缘，但植株矮小，基生叶鞘为白色膜质，小穗较小，第一颖具 3 脉，花药微小而有别。

88. 画眉草状早熟禾 (横断山区维管植物)

Poa eragrostioides L. Liu, in Addenda; 横断山区维管植物 2: 2189. 1994. nom. nud.

多年生，具短匍匐根状茎。植株高约 15 厘米，叶片短，长 2—5 厘米。圆锥花序长 5—8 厘米；小穗较大，长约 6 毫米，含 5—6 小花，第一颖具 1 脉；外稃边缘膜质，间脉明显，脉间无毛，基盘具绵毛；内稃两脊具丝状纤毛；花药长 0.7 毫米。花期 7 月。

产云南（兰坪、丽江、米里）、四川（泸定）。生于山坡草甸、半沼泽化草地中，海拔（1800—）2600—3700 米。模式标本采自云南兰坪。

89. 小药早熟禾 (禾本科图说)

Poa micrandra Keng in Fl. Tsingling. 1 (1): 435. 1976; 中国主要植物图说·禾本科 212, 图 166. 1959; 横断山区维管植物 2: 2189. 1994.

多年生，具细弱根状茎。秆直立或基部倾卧，具 3—4 节，高 30—45 厘米。叶鞘闭合直达鞘口，顶生者长 6—10 厘米，短于其叶片；叶舌长 0.5—1 毫米，钝圆；叶片质薄柔软，长约 10 厘米，宽 3—5 毫米，上面与边缘微粗糙。圆锥花序长 10—15 厘米，每节生 2—4 分枝；基部主枝长 3—8 厘米，中部以下裸露，微粗糙，上部着生较多小枝，小枝先端具 2—5 个小穗；小穗草黄色，含 4—5 小花，长 4—5 毫米；颖披针形，先端尖，脊上部微粗糙，边缘狭膜质，第一颖具 1 脉，长 1.5—2 毫米，第二颖长 2—2.8 毫米；第一外稃长 3—3.2 毫米，先端钝，与其边缘具狭膜质，脊下部 2/3 与边脉基部具长柔毛，基盘生绵毛；内稃稍短，两脊具较长丝状毛；花药长约 0.5 毫米。花果期 4—7 月。

产四川、云南西北部、陕西、山西、甘肃。生于山谷路旁、沟边草地，海拔 2500—3200 米。模式标本采自四川天全。

90. 尼泊尔早熟禾 (拟) 图版 24: 16

Poa nepalensis Wall. ex Duthie, Grass. N. W. Ind. 40. 1883; Sult. et Stew., Grass. W. Pakist. 2: 182. 1959; Bor, Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 558. 1960; Ohwi in Hara Fl. E. Himal. 2: 145. 1971; Meld. in Hara et al. Enum. Flow. Pl. Nepal 1: 143. 1978; T. A. Cope in Nasir Fl. Pakist. 143: 398. 1982; 横断山区维管植物 2: 2189. 1994. — *Poa annua* L. var. *nepalensis* Griseb. in Nachr. Ges. Wiss. Gott.