

——*Poa attenuata* var. *versicolor* Regel. in Acta Hort. Petrop. 7: 609. 1881.

多年生，疏丛。秆高 30—70 厘米，直立，平滑，花序以下的部分粗糙。叶舌长 2.5—3 毫米；叶片扁平或内卷，长约 10 厘米，宽 1.5—2 (3) 毫米，粗糙；顶生叶片达花序上部。圆锥花序金字塔形，疏展，长 15—20 厘米，宽达 10 厘米；分枝粗糙，4—5 枚簇生于各节，长达 8 厘米；小穗长 6—8 毫米，含 3—5 小花，带堇色或金黄色；两颖近相等，狭窄，线状披针形，具 3 脉，先端尖，长 (3.5) 4—5 毫米；外稃窄披针形，长 5—7 毫米，先端尖，脉不明显，无毛，脊与边脉具柔毛，基盘密生绵毛；内稃脊平滑，稀于脊间散生微毛。花期 6—8 月。

产四川 (色达、邓柯)、青海。生于山坡林缘草甸，海拔 3000—5000 米。分布于印度、克什米尔地区、伊朗、巴基斯坦、土耳其、俄罗斯、欧洲。模式标本采自俄罗斯波多利耶。

165. 基隆早熟禾 (禾本科图说) 图版 15: 5

Poa kelungensis Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. 4: 60. 1935; 中国主要植物图说·禾本科 191, 图 143. 1959. ——*Poa sphondylodes* Trin. var. *kelungensis* (Ohwi) Ohwi in Acta Phytot. Geobot. 10: 126. 1941.

多年生。秆高 30—50 厘米，具 4—8 节，较细弱，基部倾斜上升，直立，花序以下微粗糙。叶鞘无毛，顶生者长 5—7 厘米，短于其叶片；叶舌长约 4 毫米；叶片扁平，长 6—10 厘米，宽 2—3 毫米。圆锥花序狭窄而稠密，长 6—10 厘米，宽约 15 毫米，每节具 2—5 分枝，基部主枝长约 2 厘米，中下部即有小枝和小穗着生；小穗绿色或草黄色，长 4—5 毫米，含 4—5 小花；颖具 3 脉，先端锐尖，长约 2.5 毫米；外稃质地较薄，长约 2.5 毫米，先端锐尖，间脉稍明显，脊中部以下和边脉下部 1/3 具柔毛，基盘具绵毛；内稃等长于外稃，两脊粗糙；花药长约 1 毫米。颖果长 1.5 毫米，腹面有较宽的纵沟。花果期 5—8 月。

产台湾。生于平原丘陵低地、滨海路旁。模式标本采自台湾基隆。

166. 葡系早熟禾 (禾本科图说) 图版 16: 5

Poa botryoides Trin. in Fl. Zsausk 1: 83. 1929; 中国主要植物图说·禾本科 172, 图 122. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 67, 图 6963. 1976; 河北植物志 2: 1173. 1984; 中国沙漠植物志 1: 54, 图版 17: 5—8. 1985. ——*Poa serotina* var. *botryoides* Trin. ex Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. 4: 375. 1852; 横断山区维管植物 2: 2193. 1994.

多年生。秆丛生，直立，高约 60 厘米，具 4—5 节，节下生微毛。叶鞘短于节间，顶生者长 8—10 厘米，长于其叶片；叶舌长 1—2 毫米；叶片质较硬，微粗糙，长 3—6 厘米，宽 1—2 毫米。圆锥花序开展，长 10—14 厘米，宽达 4 厘米，每节具 4—5 分枝；分枝长达 3 厘米，中部以上疏生小穗，微粗糙；小穗卵形至倒卵形，长 2.5—3 毫米，含 2—3 小花，绿色带有紫色，先端黄铜色；颖具 3 脉，先端尖或渐尖，长 2—2.5 毫



图版 15 早熟禾属 *Poa* 各种小穗与外稃。1. 法氏早熟禾 *P. faberi* Rendle: 植株, 1a. 小穗, 1b. 外稃。2. 普通早熟禾 *P. trivialis* L.。3. 泽地早熟禾 *P. palustris* L.。4. 西伯利亚早熟禾 *P. sibirica* Trin.。5. 基隆早熟禾 *P. kelungensis* Ohwi.。6. 高株早熟禾 *P. alta* Hitchc.。7. 细长早熟禾 *P. proluxior* Rendle.。8. 加拿大早熟禾 *P. compressa* L.。9. 绿早熟禾 *P. viridula* Palib.。10. 南湖大山早熟禾 *P. nankoenisi* Ohwi.。(刘平绘)