

Sav. Etrang. 2: 527. 1835; Tzvel. in Fed. Poac. URSS 474. 1976; T. A. Cope in Nasir Fl. Pakist 143: 417. 1982; Roshev. in Kom. Fl. URSS 2: 404. 1934; 内蒙古植物志 7: 89, 图版 37. 图 4—7. 1983; 横断山区维管植物 2: 2198. 1994; 中国草地饲用植物资源 300. 1994; 新疆植物志 6: 102, 图版 37: 5—8. 1996.

多年生，密丛型。秆高 15—25 厘米，直立或细长，斜升，具 4—5 节，顶节位于下部 1/3 处。叶鞘微粗糙，带紫色；叶舌长 1.5—2.5 毫米；叶片狭线形，对折或内卷成针状，长 2—10 厘米，宽 1—3 毫米，边缘粗糙。圆锥花序紧缩，长圆形，长 4—7 厘米，宽 1—2 厘米；分枝单生或孪生，长 0.5—2 厘米，斜升，粗糙；小穗卵状椭圆形，含 2—4 小花，长 4—5 (5.5) 毫米；小穗轴无毛；两颖狭披针形，近相等，长约 3 毫米，具 3 脉，顶端渐尖或成尾状，脊上部微粗糙；外稃长圆状披针形，长 3—3.5 毫米，渐尖，脉不明显，脉间无毛，脊与边脉下部具柔毛，基盘有绵毛或稀少；内稃两脊具短纤毛；花药长 1—1.5 毫米。颖果纺锤形，长约 1.5 毫米。花果期 5—8 月。染色体 $2n = 28$ (Muria et al. 1984.), 42 (Quzik et al. 1980)。

产内蒙古、山西、河北、东北、新疆(天山、阿尔泰山、塔尔巴哈台山、博尔、温泉)、青海、西藏(双湖)。生于高山草甸、干旱草原，海拔 3300—5500 米。分布于印度西北部、俄罗斯西伯利亚、中亚、蒙古、巴基斯坦。模式标本产新疆阿尔泰。

本种与中亚早熟禾 *Poa litwinowiana* 体态相似，但以小穗含花较多，长 4—5.5 毫米，各部均较长，第一颖具 3 脉，长 2.5—3 毫米，第二颖较宽，顶端渐尖，脊上粗糙，长 3—3.5 毫米，外稃较长，侧面观长圆形，长 2.5—3.2 毫米，脊与边脉具柔毛，基盘具绵毛而有异。

194. 少叶早熟禾(禾本科图说)

Poa paucifolia Keng, 中国主要植物图说·禾本科 192. 图 144. 1959; 内蒙古植物志 7: 88. 图版 36, 图 10—11. 1983; 横断山区维管植物 2: 2197. 1994.

多年生，密丛。秆直立，高 15—30 厘米，具 2 节，顶节位于茎下部 1/4 处，紧接花序以下微粗糙。叶鞘微糙涩，顶生叶鞘长 5—7 厘米，长于其叶片；叶舌长 2—4 毫米；叶片质较硬，大多对折，长 3—6 厘米，宽约 1 毫米，两面糙涩。圆锥花序紧缩，长 4—7 厘米，宽 5—12 毫米；分枝孪生，长 1.5—3 厘米，直立，糙涩，中部以下裸露，上部密生较多小穗；小穗长 4.5—6 毫米，含 3—5 小花，带紫色；小穗轴平滑无毛；颖具 3 脉，脊粗糙，先端尖，第一颖长 2—3 毫米，第二颖长 3—4 毫米；外稃长约 3.5 毫米，先端有少许膜质，间脉不明显，脊下部与边脉下部 1/3 具柔毛，基盘具少量绵毛，内稃两脊粗糙；花药长 2 毫米。花期 7 月。

产内蒙古、四川北部、甘肃。生于河岸干沟、山地干旱草地。模式标本采自甘肃卓尼。