

4300 米。中亚、伊朗、俄罗斯西伯利亚、高加索、欧洲有分布。模式标本采自欧洲。

224. 尼氏早熟禾 (拟)

*Poa nevskii* Roshev. ex Ovcz. in Izv. Taj. Bazy AN SSSR 1 (1): 10. 13. 1933. et in Korn. Fl. URSS 2: 377, Pl. 28. fig. 2. 1934. — *Poa bulbosa* subsp. *nevskii* (Roshev. ex Ovcz.) Tzvel. in Nov. Sist. Vyssh. Rast. 10: 95. 1973. et in Fed. Poac. URSS 450. 1976.

多年生。秆直立，丛生，高 35—60 厘米。叶鞘基部增厚聚集于茎基而增大，平滑无毛；叶舌长 2—4 毫米；叶片线形，扁平或对折，宽 2.5 毫米，蘖生叶狭窄，较长成刚毛状。圆锥花序长 5—10 厘米，宽 1—3 厘米，具多数小穗，分枝长 1—3 厘米，粗糙；小穗长 4—5 毫米，含 3—5 小花，绿色；颖片狭披针形，第一颖短小；外稃披针形，长 2.5—3.5 毫米，间脉不明显，除脊与侧脉稍有柔毛外，全无毛，基盘无绵毛；内稃与外稃近等长；花药长 2 毫米。花期 5—6 月。

产新疆。生于山坡草地，海拔 3000—4000 米。分布于帕米尔高原。模式标本采自帕米尔。

225. 维登早熟禾 (拟)

*Poa vedenskyi* Drob. in Fl. Uzbekistan 1: 538. 1941; Bor in Rech. f. Fl. Iran. 70: 28. 1970.

多年生，矮小密丛型草本。秆高 10—15 厘米，基部具增厚叶鞘而成球形，平滑无毛。叶片长约 3 厘米，宽 1 毫米，对折呈线形。圆锥花序疏散，长约 5 厘米，宽 3—5 厘米；分枝孪生或单生，下部裸露，平滑；小穗含 3—5 小花，长 4—5 毫米，带紫色，卵状长圆形，压扁；第一颖长约 2.5 毫米，具 1 脉，第二颖等长或稍长于第一颖，具 3 脉；外稃长约 3.5 毫米，顶端尾尖，脊与边脉下部具短柔毛，基盘无绵毛；内稃脊粗糙；花药长约 1 毫米。花期 6—7 月。

产新疆。生于高山草地，海拔 3000 米。分布于伊朗、阿富汗、帕米尔高原。模式标本采自阿富汗。

226. 厚鞘早熟禾 (拟) 图版 16: 12

*Poa timoleonis* Heldr. ex Boiss. in Fl. Orient. 5: 607. 1884; Bor, Fl. Iraq. 9: tab. 41. 1968. et Rech. f. Fl. Iran. 70: 27. 1970; J. R. Edm. in Tutin et al. Fl. Europ 5: 165. 1980.

多年生，密丛。秆基具鳞茎，高 10—20 厘米，平滑无毛。叶鞘极短；叶舌长 2—5 毫米；叶片内卷线形，长 3—5 厘米，宽约 1 毫米，边缘微粗糙。圆锥花序密聚，金字塔形，长 2—3 厘米，宽 1—2.5 厘米，分枝短，孪生；小穗长 2—3 毫米，含 3—5 小花，有胎生小穗，繁殖体叶状；第一颖具 1 脉，长 1.5 (—2) 毫米，第二颖长约 2 毫米；外稃长约 2.5 毫米，先端钝，脊与边脉下部具柔毛，基盘无绵毛；内稃两脊粗糙；