

2. 硬草 (拟)

Sclerochloa dura (L.) Beauv. in Ess. Agrost. 98. 1812; Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. 4: 377. 1852; Roshev. in Kom. Fl. URSS. 2: 364, Pl. 27. f. 19a 1934; Tzvel. in Fed. Poac. URSS 513. 1976; Davis, Fl. Turkey 9: 509. 1985. — *Cynosurus durus* L. Sp. Pl. 72. 1753.

一年生。秆簇生，高 5—15 厘米，自基部分枝，膝曲上升。叶鞘平滑无毛，中部以下闭合；叶舌短，膜质，顶端尖；叶片线状披针形，无毛，上面粗糙。圆锥花序长约 5 厘米，紧密；分枝粗短；小穗含 3—5 小花，线状披针形，长达 10 毫米，第一颖长约为第二颖长之半，具 3—5 脉；外稃革质，具脊，顶端钝，具 7 脉。染色体 $2n = 14$ (Avdulov 1928)。

产新疆 (天山)。生于中山石质地带，海拔 500—1000 米。广布于欧洲、地中海地区、俄罗斯、小亚细亚、伊朗、亚洲喜马拉雅地区。模式标本采自欧洲南部。

12. 凌风草属* *Briza* L.

L. Gen. Pl. ed. 5. 32. 1754, et Sp. Pl. 70. 1753.

一年生或多年生草本。叶片扁平。圆锥花序顶生，开展；小穗宽，含少数至多花，小花紧密排列成覆瓦状而向两侧水平伸展；小穗轴无毛，脱节于颖之上及诸小花之间；两颖几相等，均稍短于第一外稃，宽广，具 3—5 脉，纸质，边缘膜质；外稃具 5 至多脉，呈舟形，下部质厚而凸出，边缘宽膜质而扩展，基部呈心形；内稃较短于外稃。染色体 $x = 5, 7$; $2n = 10, 14, 28$ 。

属模式：凌风草 *Briza media* L. 产欧洲。

约含 20 种，多数产于南美洲，欧洲和美洲北部及亚洲西北部也有分布。我国包括引种者有 3 种。

分种检索表

1. 圆锥花序下垂，具少数小穗；小穗长约 12 毫米，宽约 10 毫米，含 10—12 小花 3. 大凌风草 *B. maxima* L.
1. 圆锥花序直立，具多数小穗；小穗长 3—6 毫米，宽 4—7 毫米，含 3—8 花。
 2. 多年生；上部叶舌长 0.5—1.5 毫米；小穗长 4—6 毫米；花药长约 2 毫米 1. 凌风草 *B. media* L.

* 凌风草属见耿以礼等《中国种子植物分科检索表》附录；银鳞茅属见《中央研究院自然历史丛刊》。