

延伸，稀为光滑的小棒状；颖薄革质，顶端膜质，披针形或长圆形披针形，短于或稍长于外稃，第一颖具1脉，第二颖具1—3脉；外稃薄膜质，尖端膜质，长圆形，具3—5脉，下面1/2沿脉或遍生白色长柔毛；基盘短钝，光滑或有柔毛；内稃具凸起的2脊，沿脊有柔毛或光滑；鳞被2，常2浅裂；雄蕊2—3枚，花药黄色或紫色。颖果与内外稃分离；种脐线形。染色体大， $x=7$ 。

属模式：假拟沿沟草 *Paracolpodium altaicum* (Trin.) Tzvel. 产阿尔泰。

本属约4种，分布于高加索、俄罗斯西伯利亚、亚洲中部。我国现知2种。

本属植物为较好的高山牧草。

分种检索表

1. 颖披针形，与外稃等长或稍长；雄蕊3 2. 藏假拟沿沟草 *P. tibeticum* (Bor) E. Alexeev
1. 颖长圆状披针形或卵状披针形，较外稃短；雄蕊2。 ... 1. 假拟沿沟草 *P. altaicum* (Trin.) Tzvel.
 2. 叶片绿色，光滑，稀上面被稀疏的钝毛状物；圆锥花序紧缩，下部分枝开展；小穗长4毫米，常紫色；外稃长3.5—4毫米。 1a. 假拟沿沟草 subsp. *altaicum*
 2. 叶片灰绿色，两面或仅上面被钝的毛状物；圆锥花序狭窄，均直立；小穗长4.5—5.5毫米，常白绿色；外稃长4—5.5毫米 1b. 高山假拟沿沟草 subsp. *leucolepis* (Nevski) Tzvel.

1. 假拟沿沟草 (拟)

Paracolpodium altaicum (Trin.) Tzvel. in Journ. Bot. URSS 50: 1320. 1965. et in Fed. Poac. URSS 490. 1976; E. Alexeev in Nov. Syst. Pl. Vasc. 18: 88, t. 1, 2, 3, 1981. — *Colpodium altaicum* Trin. in Ledeb. Fl. Alt. 1: 100. 1829; Nevski in Kom. Fl. URSS 2: 436. 1934; Tzvel. in Nov. Syst. Pl. Vasc. 1964: 10. 1964. — *Catabrosa altaica* (Trin.) Boiss. in Fl. Oreint. 5: 579. 1884.

1a. 假拟沿沟草 (原亚种) 图版 31: 13—16

subsp. *altaicum*

多年生，具匍匐根状茎。秆直立或基部斜升，高15—30厘米，具2—3节，光滑无毛。叶鞘闭合达长度的1/4—1/3，较节间长，光滑；叶舌透明膜质，长约3毫米，顶端钝；叶片扁平或有时对折，绿色，光滑无毛，稀上面被钝的毛状物，长达8厘米，宽2—5毫米，顶端钝，有短尖头。圆锥花序紧缩，下部分枝开展，不稠密，长3—8厘米，宽1—3厘米；分枝斜上升，细，光滑，下部最长者达2厘米；小穗白绿色带紫色，含1小花，长约4毫米，花期展开，基部有延伸成细小棒状的小穗轴；颖顶端及边缘膜质，紫色，其余纸质，绿色，长圆状披针形，顶端渐尖，光滑无毛，第一颖长2.8—3.4毫米，具1脉，第二颖长3.2—4毫米，具3脉；外稃顶端膜质，白色带紫色，其余纸质，灰绿色长圆形，长3.5—4毫米，顶端钝，有不规则锯齿，具不太明显3脉，