

的齿;外稃披针形,点状粗糙,上部具明显的5脉,第一外稃长7—8毫米,先端延伸成芒,芒直立或稍反曲,长12—15毫米;内稃与外稃等长,线状长圆形,先端钝,脊上部具刺状纤毛。

产内蒙古。生于山坡林缘。模式标本采自内蒙古乌兰察布盟福生庄。

#### 26. 多叶鹅观草(禾本科图说)

*Roegneria foliosa* Keng, 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) 1: 32. 1963; 禾本科图说 366. 图 296. 1959. nom. nud.

植株具根头,疏丛,秆直立,高30—60厘米,具4—6节,基部叶鞘密生倒毛。叶片扁平,长15—20厘米,宽4—9毫米,上面疏生柔毛,下面无毛。穗状花序长7—13厘米;小穗含4—6小花,长14—16毫米(芒除外);小穗轴节间长约1毫米,具细柔毛;颖长圆状披针形,先端锐尖或渐尖,具明显的3—5脉,脉上平滑或微粗糙,第一颖长7—8毫米,第二颖长9—10毫米;外稃披针形,上部具明显的5脉,背部平滑无毛或近边缘具有微毛,第一外稃长9—10毫米,芒劲直或微屈曲,长10—18毫米;内稃短于外稃约1—2毫米,先端钝圆,背面无毛或于近先端处贴生微毛,脊上半部具短硬纤毛。

产内蒙古、山西。生于岩石间阴暗处。模式标本采自内蒙古百灵庙。

#### 27. 涿源鹅观草(禾本科图说)

*Roegneria aliena* Keng, 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) 1: 31. 1963; 禾本科图说 366. 图 295. 1959. nom. nud.

秆常具下伸的根茎,基部曲膝,稍倾斜,高70—90厘米,具3—4节;基部的叶鞘具微毛。叶片扁平,长12—20厘米,宽4—7毫米,上面具柔毛,下面光滑。穗状花序直立或稍弯曲,长约15厘米;小穗绿色而带紫色,长15—17毫米,含5—6小花;小穗轴节间长2—2.5毫米,被微小短毛;颖长圆状披针形,常具短小尖头,先端1侧或两侧具齿,具明显的3—5脉,第一颖长7—8毫米,第二颖长8—9.5毫米;外稃披针形,先端1侧有小裂片,背部无毛,上部具明显的5脉,第一外稃长约10毫米,先端芒直立或稍有曲折,长12—25毫米;内稃稍短于外稃,先端钝头,脊上部具有纤毛。

产河北、山西。生于路旁。模式标本采自河北涿源县。

系14. 齿草系——*Ser. Dentatae* Nevski in Act. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS ser. 1. fasc. 2, 49. 1936; 禾本科图说 370. 1959; 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) 1: 35. 1963.

穗状花序紧密,直立;小穗常偏于穗轴之1侧;颖等于或微短于下部小花,广披针形,长11—15毫米,宽2.5—4毫米,偏斜,急尖,顶端具1或2齿;外稃糙涩,具短芒或长芒。

#### 28. 宽叶鹅观草(禾本科图说)

*Roegneria platyphylla* Keng, 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) 1: 35.