

显5脉,第一外稃长9—11毫米,芒粗壮,糙涩,带紫色,反曲,长18—28毫米;内稃几等长于外稃,背部具微毛,脊上部1/3具细短纤毛。

产甘肃、内蒙古等省区。生于山坡。模式标本采自甘肃隆德。

57. 台湾鹅观草(禾本科图说)

Roegneria formosana (Honda) Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. **10** (2): 95. 1941; 禾本科图说 386. 1959; 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) **1**: 58. 1963. — *Agropyron formosanum* Honda in Bot. Mag. Tokyo **41**: 385. 1927.

57a. 台湾鹅观草(原变种) 图版 22: 7—8

var. **formosana**

秆直立,高60—80厘米。叶鞘无毛;叶片线形,长达20厘米,宽4—6毫米,无毛或粗糙。穗状花序长15—20厘米,稍下垂;小穗疏松排列,长约2厘米,含5—7小花;颖不等长,第一颖长约5毫米,第二颖长约7毫米,披针形,先端尖,具5—7脉,脉显明而粗糙;外稃长圆状披针形,长约8毫米,边缘具短纤毛而无膜质,背部圆形,粗糙或具粗糙状纤毛,具5脉,其脉在上部明显,先端具长芒;芒粗糙,质硬,基部扩张,长约2厘米,通常反曲;内稃与外稃等长,披针形,顶端钝而微2裂,具2脊,脊上具纤毛;颖果长超过3毫米,顶端具柔毛。

产我国台湾。生于中海拔以上开阔地山坡上。模式标本采自台湾罗哥山。

57b. 长芒台湾鹅观草(变种)

var. **longearistata** Keng, 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) **1**: 59. 1963; 禾本科图说 386. 图 315. 1959. nom. nud.

本变种与原变种的主要区别为: 叶片较狭,宽仅2—4毫米;穗状花序仅长7—10厘米;颖较长,第二颖长可达9毫米;外稃长8.5—11毫米,以及其芒长可达35毫米。花期7月。

产我国台湾省。生于高山。模式标本采自台湾台北,太平山。

57c. 毛鞘台湾鹅观草(变种)

var. **pubigera** Keng, 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) **1**: 60. 1963; 禾本科图说 387. 1959. nom. nud.

本变种植株矮小,高30—50厘米;基部叶鞘有毛,叶片宽2—4毫米;穗状花序长10—12厘米;外稃先端芒长1—2厘米等性状可与原变种区别。

产我国台湾省。模式标本采自台湾。

58. 岷山鹅观草(拟) 耐久鹅观草(禾本科图说) 图版 23: 7—12

Roegneria dura (Keng) Keng, 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) **1**: 54. 1963. — *Brachypodium durum* Keng in Sunyatsenia **6** (1): 54. 1941. — *Roegneria dura* Keng var. *variuglumis* Keng, 禾本科图说 382. 1959. syn. nov.