

学) 1:79. 1963; 禾本科图说 404. 1959. nom. nud.

穗状花序稍疏松, 两侧匀称, 穗轴沿棱边具纤毛, 余皆无毛; 小穗草黄色或稍带黄色; 颖片窄矩形, 远短于下部小花, 具 1—3 脉, 脉上具短小刺毛; 外稃披针形, 全部具糙毛, 有芒, 芒长为稃体的 1/2 至等长。

64. 窄颖鹅观草(禾本科图说) 图版 24:11

*Roegneria stenachyra* Keng, 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) 1: 79—80. 1963; 禾本科图说 404. 图 333. 1959. nom. nud.

秆直立, 高约 60—90 厘米, 紧接花序下平滑无毛, 具 3 节, 其第二节膝曲。叶鞘无毛; 叶片质硬, 干后内卷, 长 5—15 厘米, 宽 3—5 毫米, 上面被微毛, 下面无毛。穗状花序长约 10 厘米, 宽约 1 厘米; 小穗草黄色或带紫色, 长 12—15 毫米(芒除外), 含 4—5 小花; 颖窄矩形, 先端尖, 长约 4 毫米或第二颖长约 5 毫米, 具 1—3 脉, 脉上具小刺毛; 外稃疏生(或上部密生)较长的硬毛, 第一外稃长约 10 毫米, 先端芒糙涩, 长 5—10 毫米; 内稃短于外稃, 先端截平或微凹, 脊间上部被刺状纤毛; 花药带黑色。

产甘肃、青海等省。生于海拔 3200 米的山坡草地。模式标本采自甘肃酒泉。

65. 孪生鹅观草(南京大学学报)

*Roegneria geminata* Keng et S. L. Chen, 南京大学学报(生物学) 1: 80. 图 6. 1963.

秆丛生, 高 75—100 厘米, 平滑无毛或在花序下稍被毛茸。叶鞘无毛; 叶片扁平, 长 7.5—27 厘米, 宽 3—5 毫米, 边缘具纤毛, 上面疏生柔毛或粗糙, 下面无毛。穗状花序长 8—15 厘米, 弯曲下垂; 在穗轴下部数节具 2 枚小穗, 上部者具 1 枚小穗, 有时在基部 1 节可生出具 2—5 小穗的短枝, 枝(连同小穗)长 2—3.5 厘米; 小穗长 16—20 毫米, 含 5—7 小花, 下部者通常具 0.5—1 毫米的小穗柄; 颖披针形, 具 3 脉或第二颖可具 4—5 脉, 绿白色或常染有紫色, 先端渐尖或具小尖头, 背部疏生长柔毛(其毛长达 0.6 毫米), 第一颖长 5—8 毫米, 第二颖长 6—8 毫米; 外稃长圆状披针形, 绿白色而染有紫色, 全部密生长约 0.5 毫米的柔毛, 第一外稃长 9.5—10.5 毫米, 先端具直而稍曲的芒, 芒紫色, 刺毛状粗糙, 长 5—11 毫米; 内稃与外稃等长, 先端渐窄而截平, 背部被短而稀的柔毛, 脊上疏生透明纤毛, 其毛长 0.6—1.2 毫米, 向顶端渐短而细, 向基部渐稀疏。

产青海。生于海拔约 3000 米的河滩沙地。模式标本采自青海门源县。

系 26. 糙毛草系——*Ser. Hirsutae* Keng, 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) 1: 84. 1963; 禾本科图说 406. 1959. nom. nud.

穗状花序下部稍疏松, 上部则紧密且几偏于 1 侧; 穗轴背部及紧接花序下之秆的部分具柔毛; 小穗带黄色; 颖卵状矩形, 长约为下部小花的 1/2—2/3, 具粗壮的 3 脉, 无毛或脉上常微糙涩; 外稃全部具糙毛, 顶端延伸成短芒或无芒。

66. 糙毛鹅观草(禾本科图说)

*Roegneria hirsuta* Keng, 耿以礼及陈守良, 南京大学学报(生物学) 1: 84—85.