

芽鳞。叶鞘下部者短于节间，上部者或长于节间；叶舌薄膜质，长达1厘米，披针形，常撕裂；叶片披针形，长15—25厘米，宽1—1.5厘米，两面粗糙。圆锥花序长10—15厘米，宽4—5厘米；小穗长约5毫米；颖质地薄，第一颖具1脉，长约2.5毫米，第二颖具3脉，长约3.5毫米；两雄花外稃长约5毫米，外稃具5脉，背部粗糙，边缘具纤毛，背部近顶端具长约1毫米的芒；两性花长约3.5毫米，黄褐色，外稃背部平滑，顶端微糙涩；雌蕊花柱长约3毫米，柱头毛刷状，长约4毫米。花期6月。

产甘肃西南部、四川西部。生于海拔2500—3000米的山谷草丛中或林缘。模式标本采自喜马拉雅山西部。

3. 光稃香草(禾本科图说) 图版 45: 4—7

Hierochloa glabra Trin. in Spreng. Neue Entdeck 2:66. 1821; 禾本科图说 621. 图 559. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 99. 图 7027. 1976.

多年生。根茎细长。秆高15—22厘米，具2—3节，上部长裸露。叶鞘密生微毛，长于节间；叶舌透明膜质，长2—5毫米，先端啮蚀状；叶片披针形，质较厚，上面被微毛，秆生者较短，长2—5厘米，宽约2毫米，基生者较长而窄狭。圆锥花序长约5厘米；小穗黄褐色，有光泽，长2.5—3毫米；颖膜质，具1—3脉，等长或第一颖稍短；雄花外稃等长或较长于颖片，背部向上渐被微毛或几乎无毛，边缘具纤毛；两性花外稃锐尖，长2—2.5毫米，上部被短毛。花果期6—9月。

产辽宁、河北、青海。常生于海拔470—3250米的山坡或湿润草地。模式标本采自苏联。

4. 茅香(植物学大辞典)

Hierochloa odorata (Linn.) Beauv. Ess. Agrost. 164. 1812; 禾本科图说 620. 图 558. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 98. 图 7026. 1976; 秦岭植物志 1(1): 156. 1976. — *Holcus odoratus* Linn. Sp. Pl. 1048. 1753.

4a. 茅香(原变种) 图版 45: 8—11

var. *odorata*

多年生。根茎细长。秆高50—60厘米，具3—4节，上部长裸露。叶鞘无毛或毛极少，长于节间；叶舌透明膜质，长2—5毫米，先端啮蚀状；叶片披针形，质较厚，上面被微毛，长5厘米，宽7毫米，基生者可长达40厘米。圆锥花序长约10厘米；小穗淡黄褐色，有光泽，长5(6)毫米；颖膜质，具1—3脉，等长或第一颖稍短；雄花外稃稍短于颖，顶具微小尖头，背部向上渐被微毛，边缘具纤毛；孕花外稃锐尖，长约3.5毫米，上部被短毛。花果期6—9月。

产内蒙古、甘肃、新疆、青海、陕西、山西、河北、山东、云南等省区。常生于海拔850—3750米的阴坡、河漫滩或湿润草地。模式标本采自欧洲。

本种因含香豆素，可用作香草浸剂；其根茎蔓延还可巩固坡地以防止水土流失。