

稃膜质,长约8毫米,具5脉,微粗糙,先端渐尖而无芒或由中脉延伸成长达0.5毫米之短芒,或于距顶端以下1/4处生出1长约2.5毫米的细直芒,基盘具长约1毫米之短毛;内稃长5—7毫米,延伸小穗轴长约4.5毫米,连同其上长3毫米之柔毛共长达7毫米。颖果黑色,长4—5毫米,扁平,长圆形,先端具1宿存呈喙状之花柱;第二花如存在时,其外稃长约5毫米,并具正常发育的果实。花果期夏季。

特产四川。生于海拔4000米之高山杜鹃林下。模式标本采自四川木里。

2. 小丽茅(禾本科图说)

Deyeuxia pulchella (Griseb.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 7: 268. 1896; 禾本科图说 509. 图 433. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 105. 1976. — *Calamagrostis pulchella* Griseb. in Nachr. Ges. Wiss. Goett. 78. 1868.

2a. 小丽茅(原变种) 图版 47: 5—8

var. *pulchella*

多年生,具长而横走且生有膜质鳞片的根茎。秆直立,疏丛,平滑仅于花序下粗糙,高30—40厘米,径1—1.5毫米,具2—3节。叶鞘短于节间,粗糙;叶舌薄膜质,长2—4毫米,顶端易破碎;叶片扁平,干后内卷,两面稍粗糙,长2—13厘米,宽1—4毫米。圆锥花序紧密成穗状,长圆形或卵状长圆形,长3—7厘米,宽8—15毫米,分枝粗糙,直立或贴生;小穗长3—5(6)毫米,深紫色或幼嫩时绿色;颖披针形,近等长或第一颖稍短,先端尖,粗糙,具1脉,第二颖具3脉;外稃长3—4.5毫米,顶端与边缘常透明膜质,基盘两侧的柔毛长约1毫米,芒自外稃顶端下1/6—1/4处伸出,细直,长1—2.5毫米;内稃约短于外稃1/3;延伸小穗轴长约1.5毫米,密被长3—3.5毫米的柔毛,二者共长4—5毫米;花药长约2毫米,紫色或深褐色。花期7—8月。

产西藏、四川、云南。喜生于高山草甸,海拔3000—5200米。印度北部、不丹、锡金、尼泊尔、克什米尔地区也有分布。模式标本采自锡金。

2b. 川藏野青茅(变种) 图版 47: 9—11

var. *laxa* P. C. Kuo et S. L. Lu, 西藏植物志第5卷, 218. 1987.

本变种与原变种的主要区别为,秆高40—55厘米,具3—5节。圆锥花序疏松,长9—13厘米,宽3—5厘米;小穗长5—6毫米;外稃的芒长4—6毫米。

产西藏(亚东)、四川(峨边县、康定)。生于山坡灌丛中,海拔2900米。模式标本采自西藏亚东。

3. 玫红野青茅(拟) 图版 47: 12—14

Deyeuxia rosea Bor in Kew Bull. 1954: 498. 1954. — *Calamagrostis borii* Tzvel. in Pl. Asiae Centr. 4: 83. 1968.

多年生。具细长而横走的根状茎。秆直立,平滑,高约35厘米,径约2毫米,具2节。叶鞘平滑或基部微糙涩;叶舌膜质,长3—7毫米,顶端撕裂;叶片扁平,两面及边缘糙涩,