

15 厘米,主轴节间长 3—7 厘米且粗糙,分枝簇生,稍糙涩,开展,长达 15 厘米,下部裸露;小穗长 3—4 毫米,灰绿色基部带紫色;两颖近等长,披针形,顶端钝或稍尖,具 1 脉,第二颖具 3 脉,主脉中、上部稍粗糙;外稃稍短于颖,顶端具 4 微齿,基盘两侧的柔毛长约为稃体的 1/3,芒自稃体基部 1/5 处伸出,长 4—5 毫米,细直或微弯,下部稍扭转;内稃近等长于外稃,顶端具细齿;延伸小穗轴长 0.5—0.7 毫米,与其所被柔毛共长 2—3 毫米;花药长 1.5—2 毫米。 花果期 7—10 月。

产四川、云南(镇雄县)、陕西(宁强县、南郑县)、河南(卢氏县)。生于山谷、沟边潮湿之处,海拔 600—2500 米。模式标本采自四川。

8. 短舌野青茅(拟)

Deyeuxia matsudana (Honda) Keng in Sunyatsenia **6**(2): 92. 1942; Hsu in Taiwania **16**: 233. 1971; 台湾禾草 271. 图 30. 1975; 台湾植物志 **5**: 415. 1978. — *Calamagrostis matsudana* Honda in Bot. Mag. Tokyo **40**: 439. 444. 1926.

多年生,具根状茎。秆纤细,高 20—30 厘米。叶舌微小,顶端平截;叶片扁平,长约 5 厘米。圆锥花序开展,长约 5 厘米;小穗含 1 小花,长约 3.5 毫米;颖片披针形,先端锐尖,两颖近等长,第一颖具 1 脉,第二颖具 3 脉;外稃近等长于颖,披针形,顶端具 3 齿裂,具 3 脉,中脉延伸成芒,基盘两侧的柔毛长为外稃的 1/2;内稃具 2 龙骨突起,顶端 3 齿裂,延伸小穗轴长约 1.5 毫米,具毛,鳞被先端尖锐,长约 1 毫米;花药长约 2 毫米。

特产我国台湾。生于中海拔林地。模式标本采自台湾能高山。

本文录自《台湾禾草》。

9. 水山野青茅(台湾禾草)

Deyeuxia suizanensis (Hayata) Hsu in Taiwania **16**: 233. 1971; 台湾禾草 273. 图 31. 1975; 台湾植物志 **5**: 415. 1978. — *Agrostis suizanensis* Hayata in Ic. Pl. Formos **7**: 83. f. 50. 1918. — *Calamagrostis suizanensis* (Hayata) Honda in Bot. Mag. Tokyo **40**: 440. 1926.

多年生。秆纤细,丛生。叶鞘与叶片间具毛;叶舌长约 0.5 毫米,顶端钝圆;叶片细丝状,宽约 0.3 毫米。圆锥花序疏松,长约 5 厘米;小穗含 1 小花,长约 4 毫米;颖片披针形,先端锐尖,第一颖具 1 脉,与第二颖近等长,第二颖具 3 脉,两侧脉较短;外稃长约 3.5 毫米,宽披针形,顶端下凹,具 5 脉,中脉延伸成芒,基盘两侧的柔毛长为外稃的 1/3;内稃线形,长约 3 毫米,顶端下凹,具 2 龙骨突起,延伸小穗轴长约 1 毫米,且具长约 3 毫米的柔毛;鳞被先端尖锐,长约 0.6 毫米;花药长约 1.6 毫米。

特产我国台湾。生于中海拔林地山坡。模式标本采自台湾嘉义县水山。

本文录自《台湾禾草》。

10. 房县野青茅(中国高等植物图鉴) 亨利野青茅(禾本科图说) 图版 49: 4—5

Deyeuxia henryi Rendle in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 393. 1904; 禾本科图说