

516. 图 411. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 106 图 7041. 1976.

多年生。秆少数丛生,直立,粗壮,高 100—130 厘米,紧接花序以下粗糙,常具 3—4 节。叶鞘下部者长于节间且被微糙毛,上部者短于节间且疏被微毛或平滑无毛;叶舌干膜质,长披针形,长 5—15 毫米,顶端易撕裂;叶片线形,长 15—90 厘米,宽 4—10 毫米,主脉粗糙,上面具短柔毛,下面及边缘粗糙。圆锥花序开展,长 20—40 厘米,宽达 15 厘米,分枝细弱,粗糙,簇生,平展或斜向上升,下部 1/4 或 1/2 裸露;小穗带紫色,长 4—5(7)毫米;两颖近等长,披针形,具 1 脉,第二颖具 3 脉,中脉粗糙;外稃长 3.5—4(5.5)毫米,顶端具 4 微齿,基盘两侧之柔毛长约为稃体的 1/3,稀可长达稃体的 1/2,芒自稃体背基部 1/6 处伸出,长 5—7 毫米,近中部膝曲且芒柱扭转;内稃近等长或稍短于外稃,顶端钝且具细齿;延伸小穗轴长 1—1.5 毫米,与其所被柔毛共长 2.5—3.5 毫米;花药长 2—2.5 毫米。 花果期 7—10 月。

产湖北、湖南、四川、贵州、云南、江西(庐山)、陕西(丹凤县、商南县、南郑县)。生于山坡草地、林下及沟边,海拔 1300—2600 米。模式标本采自湖北房县。

11. 华高野青茅(禾本科图说) 图版 49: 6

Deyeuxia sinelator Keng ex P. C. Kuo, 秦岭植物志 1(1): 137. 441. 图 109. 1976. —*Deyeuxia sinelator* Keng, 禾本科图说 517. 图 442. 1959, et 中国高等植物图鉴 5: 106. 1976. nom. nud.

多年生。秆少数丛生,直立,高 130—150 厘米,基部径 3—5 毫米,常具 3 节,顶节位于秆的中部以下,平滑或花序以下稍糙涩。叶鞘多短于节间,无毛或稍粗糙,顶生者长 27—30 厘米(长于它的叶片);叶舌干膜质,长圆形,长 4—20 毫米,顶端易破碎;叶片线形,长 9—45 厘米,宽 4—8 毫米,上面疏生细柔毛,下面粗糙。圆锥花序开展,长 22—35 厘米,宽 6—15 厘米,主轴节间无毛,稍糙涩,长 2.5—5.5 厘米,基部节间长可达 9 厘米,分枝粗糙,簇生,开展或斜升,下部 1/2 或 1/3 常裸露;小穗长 4—5 毫米,草黄色或带紫色;小穗柄粗糙,短于小穗;两颖近等长或第二颖较短,第一颖先端尖,具 1 脉,脉上粗糙,第二颖先端较钝,具 3 脉,脉上部稍粗糙;外稃长 3.5—4 毫米,顶端钝而具细齿,基盘两侧之柔毛长约 3 毫米,稍短于稃体,芒自稃体基部伸出,长约 5 毫米,近中部膝曲,芒柱扭转;内稃近等长于外稃,顶端钝,具细齿;延伸小穗轴长约 1 毫米,与其所被柔毛共长达 4 毫米;花药长约 2 毫米。 花期 8—9 月。

产河南、陕西(秦岭北坡)、四川。生于山坡林下或林缘,海拔 1000—3200 米。模式标本采自河南卢氏县。

12. 美丽野青茅(拟)

Deyeuxia venusta Keng in Sunyatsenia 6(1): 66. 1941.

多年生。秆直立或基部外倾,高 30—40 厘米,径约 2 毫米,具 2 节。叶鞘疏松,光滑;叶舌长 4—6 毫米,平截或卵圆形,叶片扁平,长 4—12 厘米,宽 2—5 毫米,微粗糙。圆锥花



1—3. 疏穗野青茅 *Deyeuxia effusiflora* Rendle: 1. 小穗, 2. 小花, 3. 叶舌。4—5. 房县野青茅 *D. henryi* Rendle: 4. 叶舌, 5. 小花。6. 华高野青茅 *D. sinelatior* Keng ex P. C. Kuo: 小花。7—9. 长花野青茅 *D. longiflora* Keng: 7. 植株, 8. 小穗, 9. 小花。10—12. 细柄野青茅 *D. filipes* Keng: 10. 花序, 11. 小穗, 12. 小花。(王 颖绘)