

36: 396. 1904; 禾本科图说515. 1959; 秦岭植物志1(1): 138. 1976.

本变种与原变种的区别为, 秆高达1米。叶鞘密生柔毛; 叶舌长2—3毫米。圆锥花序紧密, 长8—20厘米, 宽1.5—2厘米; 小穗长5—5.5毫米; 外稃长4—4.5毫米, 基盘两侧的柔毛长为稃体的1/2; 花药长约2毫米。花果期8—10月。

产东北、华北诸省。生于山坡草地及路旁, 海拔400—1800米。日本和苏联的东部西伯利亚及远东部分也有。模式标本采自日本。

24. 长序野青茅(拟)

Deyeuxia ampla Keng in Sunyatsenia 6(2): 92. 1942.

秆高约1米, 在花序下平滑。叶鞘上部无毛, 具条纹, 长可到40厘米; 叶片上部者长可达11厘米, 宽约2毫米, 粗糙。圆锥花序披针形, 长约40厘米, 基部内藏, 分枝伸展, 长可达15厘米, 粗糙, 下面裸露部分长, 分枝和小穗柄均粗糙; 小穗长约6毫米, 窄披针形, 淡绿色; 两颖近等长, 渐尖, 脊和背上部常粗糙; 外稃长约5毫米, 基盘两侧的柔毛长约为外稃的1/2, 芒近基部伸出, 长7—8毫米, 膝曲; 延伸小穗轴长2.5—3毫米, 先端细弱, 中下部被长约2.5毫米的柔毛。

特产我国台湾。模式标本采自台湾 (Mt. Rantai)。

因没见到标本, 仅将原文记载译出。

25. 两花野青茅(拟)

Deyeuxia biflora Keng in Sunyatsenia 6(2): 90. 1942.

多年生, 基部具许多嫩枝和茂盛的叶。秆单生, 直立, 高约60厘米, 具2节, 顶节长裸露, 在节下具倒向柔毛。叶鞘具条纹, 光滑, 顶生者长, 下部特别在基部具倒向的柔毛; 叶舌质硬, 长1—2毫米; 叶片纵卷, 长3—6厘米, 基生者长可达8厘米, 细丝状, 平滑。圆锥花序窄狭, 紧密, 长约14厘米, 宽约1厘米, 分枝、小穗柄如花序主轴均被微柔毛或粗糙; 小穗长披针形, 含2小花, 长5—6毫米, 上面的花较小, 两性, 长约4毫米; 两颖近等长, 渐尖, 具1脉, 脊和上部粗糙, 顶端常带紫色, 第一外稃近等长于第一颖, 粗糙, 顶端微2裂, 基盘两侧的柔毛长约1毫米, 芒自稃体基部2/5处伸出, 芒长6—8毫米, 中部以下扭转; 内稃微短于外稃, 近上部具2脊, 脊之间具浅沟, 延伸小穗轴长约2毫米, 被长1—1.5毫米的柔毛。

特产我国台湾。生于海拔3000米的山坡。模式标本采自台湾。

因没见到标本, 仅将原文译出。

26. 川野青茅(拟) 感野青茅(禾本科图说)

Deyeuxia grata Keng in Sunyatsenia 6(2): 87. 图 2. 1942, et 禾本科图说 511. 图 437. 1959; 中国高等植物图鉴5: 848. 1976.

多年生, 具根头。秆丛生, 直立, 高30—55厘米, 径1—1.8毫米, 具3节, 顶生节位于中部或中部以上。叶鞘无毛, 上部者短于节间, 顶生叶鞘长9—18厘米, 长于它的叶片; 叶舌干膜质, 两侧下延, 先端呈齿蚀状或破碎, 长2—3毫米; 叶片直立, 内卷, 长8—17厘