

Deyeuxia moupinensis (Franch.) Pilger in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 225. 1900.

—*Calamagrostis moupinensis* Franch. Nouv. Arch. Mus. **2**(10): 106. 1888.

多年生,具短根状茎。秆直立,平滑无毛,高40—60厘米,径2—3毫米,具3—4节,节带褐色。叶鞘下部者长于上部者短于节间,被倒向的短毛或无毛;叶舌平截,长约0.5毫米;叶片扁平或内卷,长10—20厘米,宽2—5毫米,两面粗糙。圆锥花序紧密或稀疏松,常被顶生叶鞘所包,长8—14厘米;宽1.5—3厘米,分枝2—5枚簇生,细弱,粗糙,直立贴生或斜伸,自基部即生小穗或基部主枝1/3以下裸露;小穗长3.5—4毫米,草黄色或带淡紫色;两颖近等长,窄披针形,先端尖,粗糙,第一颖具1脉,第二颖具3脉;外稃长约3毫米,具5脉,顶端2裂,裂齿达稃体的1/2—1/3处,芒自裂齿间伸出,长5—6毫米,细直,明显伸出小穗之外,基盘两侧的柔毛等长于稃体;内稃约短于外稃1/3,顶端微2裂;延伸小穗轴与其所被柔毛共长达3毫米;花药长约1.2毫米。花期8—9月。

产四川(宝兴)。生于海拔1300—2600米的山坡林下。模式标本采自四川宝兴县。

38. 箱根野青茅(禾本科图说) 图版54: 1—3

Deyeuxia hakonensis (Franch. et Sav.) Keng in Sinensia **11**: 411. 1940, et 禾本科图说 518. 图 445. 1959; 中国高等植物图鉴 **5**: 848. 1976. —*Calamagrostis hakonensis* Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap. **2**: 599. 1789.


多年生,具横走根状茎。秆细弱,直立,平滑无毛,高30—60厘米,径0.5—1毫米。叶鞘短于节间,无毛或脉间具倒生而易落的毛,边缘及鞘口常疏生柔毛;叶舌干膜质,长约1毫米,钝圆或平截;叶片线形,扁平或边缘内卷,长10—25厘米,宽2—6毫米,上面被微柔毛,下面无毛。圆锥花序疏松,长6—15厘米,宽1—3厘米,分枝常孪生,稀可单生或3枚簇生,粗糙,下部常裸露;小穗草黄色或稍带紫色,长4—5毫米;颖片披针形,先端稍钝,两颖近等长或第二颖稍短,第一颖具1或2脉,第二颖具3脉,仅中脉粗糙;外稃长3—4毫米,顶端钝或具细齿,基盘两侧的柔毛长为稃体的2/3或1/2,芒自稃体基部伸出,细直,长2—4毫米;内稃近等于或微短于外稃,顶端钝或微凹;延伸小穗轴长1—1.5毫米,与其所被柔毛共长2.5—3毫米;花药长约1.5毫米。花期7—8月。

产安徽黄山、浙江天目山、江西(安福)、湖北(恩施)、广州、四川(南川)、贵州。生于山坡草地、林下及山谷溪边石缝中,海拔680—2100米。模式标本采自日本箱根。

39. 顶芒野青茅(拟) 图版54: 4—7

Deyeuxia nepalensis Bor in Kew Bull. **1957**: 411. 1958, et Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 399. 1960.

多年生,具根状茎。秆高50—60厘米,径2—3毫米,平滑无毛。叶鞘平滑,紧密抱茎;叶舌膜质,长3—5毫米,秆生叶舌长可达7毫米,顶端钝或稍尖;叶片扁平或纵卷,长达25厘米,宽2—4毫米,两面平滑无毛或有时稍糙涩,边缘粗糙。圆锥花序疏松开展,长10—15厘米,宽达12厘米,分枝平滑无毛,平展或斜升,长4—8厘米,中部以下裸露;小



1—3. 箱根野青茅 *Deyeuxia hakonensis* (Franch. et Sav.) Keng: 1.花序, 2.小穗, 3.小花。
4—7. 顶芒野青茅 *D. nepalensis* Bor: 4.叶舌, 5.花序, 6.小穗, 7.小花。8—10. 大叶章 *D. langsdorffii* (Link.) Kunth: 8.花序, 9.小穗, 10.小花。(王 颖绘)