

1—1.5 毫米。 花期 7—8 月。

产黑龙江、吉林(珲春、安图)、辽宁。生于海拔 680—2300 米的山坡草地、林间草地、路旁及沟边湿地。模式标本采自东北。

42. 散穗野青茅(禾本科图说) 图版 55: 1—3

*Deyeuxia diffusa* Keng in Sunyatsenia 6(2): 94. 1942, et 禾本科图说 524. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 849. 1976.

多年生。秆直立,高 30—60 厘米,径约 1 毫米,平滑无毛,具 4—6 节。叶鞘常短于节间;叶舌膜质,长 1.5—3 毫米,顶端具齿裂;叶片纵卷,长 10—20 厘米,宽 1—3 毫米。圆锥花序疏松开展,长 15—30 厘米,分枝细线形,长达 15 厘米,平滑,下部裸露,上部疏松地作三叉或二叉分枝,小枝与小穗柄呈细丝状,弯曲;小穗长 2—3 毫米,褐紫色;两颖不等长,第一颖窄披针形,先端渐尖,长 1.5—2 毫米,第二颖宽披针形,顶端钝,长 2—3 毫米;外稃长 1.5—2.5 毫米,顶端钝或微凹,无芒,基盘两侧的柔毛等长于稃体或稍短;内稃长为外稃的 1/2 或 2/3;延伸小穗轴长约 0.5 毫米,与其所被柔毛共长 1—1.5 毫米;花药长约 0.5 毫米。颖果长圆形,长约 1.5 毫米。花果期夏秋季。

产四川、贵州、云南。生于山坡草地、灌丛草地及撩荒地草丛,海拔 1900—2750 米。模式标本采自云南。

43. 柔弱野青茅(禾本科图说) 图版 55: 4—6

*Deyeuxia flaccida* Keng, 禾本科图说 524. 图 450. 1959. sine latin. —— *Calamagrostis flaccida* (Keng) Keng f., 植物研究 4(3): 195. 1984. descr. latin.

多年生。秆高约 1 米,径约 1 毫米,细弱,稍压扁,露出鞘外之节间部分常髓涩,通常具 6 节,顶节距秆基约 65 厘米。叶鞘粗糙,短于或近中部者长于节间,顶生叶鞘长约 16 厘米,(约 3 倍长于其叶片);叶舌膜质,易破碎,长 1—4 毫米;叶片质薄,扁平,无毛,先端渐尖,长 5—17 厘米,宽 1—4 毫米,圆锥花序开展,柔弱,长约 18 厘米,宽约 14 厘米,分枝细弱,细线形,下垂,近于平滑,每节通常具 5 枚而上部者为 2 或 3 枚簇生,约自中部以上可 1 至 3 回 3 叉地分出小枝,基部主枝长约 10 厘米,小穗柄纤细,粗糙,顶端膨大,侧生者长 2—4 毫米;小穗长约 4 毫米,灰绿色而先端带紫色;颖片披针形,第一颖较第二颖长 0.5 毫米,先端锐尖,背具 1 脉成脊,脊上粗糙,第二颖先端较钝,除主脉外基部可具不很明显的 2 侧脉,其脊较平滑;外稃长约 3.5 毫米,先端钝,具 5 脉,其脉至顶端则渐消失,无芒,基盘两侧的毛长约 3 毫米;内稃长约为外稃的 1/2;延伸小穗轴长约 0.8 毫米,与其所被柔毛共长达 2.5 毫米;花药长约 0.7 毫米。颖果黄棕色,纺锤形,压扁,长约 2 毫米。 花果期 7—8 月。

特产我国四川。生于海拔 2200—3000 米的竹林下或路旁潮湿处。模式标本采自四川峨眉山。



1—3.散穗野青茅 *Deyeuxia diffusa* Keng: 1.植株, 2.小穗, 3.小花。4—6.柔弱野青茅 *D. flaccida* Keng: 4.花序, 5.小穗, 6.小花。(宁汝莲、王颖绘)