

达 7 厘米;叶舌干膜质,上部者长达 2 毫米;叶片线形,长 5—10 厘米,对折或内卷,先端急尖或钝,内缘具毛。圆锥花序披针形,长 7—10 厘米,宽 10—15 毫米,花后收缩,每节具 3—4 分枝,分枝基部有小穗腋生;小穗紫色,长 1.5 毫米,穗梗先端加粗,成棒柱状;两颖等长,长圆形,成舟状,脊上部粗糙,先端急尖,具 1 脉,或具不明显的短侧脉;外稃长达 1.2 毫米,宽椭圆形,白色膜质,背部具极不明显的 4—5 脉,先端截形,近全缘,基盘两侧之毛极短,长 0.2 毫米;内稃长约为外稃的 1/3,无脊;花药长 7—8 毫米。

产我国台湾省(未见标本)。模式标本采自台湾。

15. 华北剪股颖(禾本科图说)

Agrostis clavata Trin. in Spreng. Neuc. Entd. Pflanzenk. 2: 55. 1821; 禾本科图说 541. 图 470. 1959; Tzvel. Poac. URSS 335. 1976; 中国高等植物图鉴 5: 111. 图 7051. 1976. ——*Agrostis wulingensis* Honda Rep. First Sci. Manch. sect. 4.2: 10. t. 3. 1935.

15a. 华北剪股颖(原变种) 图版 59: 1—4

var. *clavata*

多年生草本,具细弱根茎。秆丛生,直立或基部微膝曲,高 35—90 厘米,直径 1—2 毫米,平滑,具 3—4 节。叶鞘无毛,一般短于节间;叶舌膜质,长 2—4 毫米,先端钝或撕裂,背面微粗糙;叶片扁平,线形,长 6—15 厘米,宽 1.5—3(5) 毫米,微粗糙。圆锥花序疏松开展,长 10—24 厘米,宽 5—10 厘米,分枝纤细,微粗糙,向上伸展,每节具分枝 2 至多数;小穗黄绿色或带紫色,长达 2.2 毫米,一般为 2 毫米;两颖近等长,第一颖较第二颖可长达 0.2 毫米,脊上粗糙,外稃长约 1.8 毫米,与颖近等长,先端钝,无芒,脉不明显,基盘两侧具长 0.2 毫米之毛;内稃长 0.2—0.5 毫米,似倒卵形,先端平截,明显具齿;花药长 0.4—0.6 毫米。颖果扁平,纺锤形,长约 1.2 毫米。 花果期夏秋季。

产我国的东北和华北地区诸省,以及山东、陕西二省。生于林下、林边、丘陵、河沟以及路旁潮湿地方。模式标本采自堪察加。

15b. 广东剪股颖(变种)

var. *macilentia* (Keng) Y. C. Yang, comb. nov. ——*Agrostis macilentia* Keng in Su-nyatsenia 3: 17. 1935.

本变种花药较大,长 0.8—1 毫米。颖果短而宽,呈椭圆状长圆形,长约 1 毫米。

产广东省。生于路边。模式标本采自广东。

15c. 四川剪股颖(变种)

var. *szechuanica* Y. C. Tong. ex Y. C. Yang, 植物研究 4(4): 99. 1984.

似华北剪股颖,但小穗长约 3 毫米;内稃近全缘;花药长 0.7—0.8 毫米;两颖不等长而有区别。

产四川省。生于海拔 3800—4000 米的山坡上。模式标本采自四川汉源。

16. 剪股颖(中国高等植物图鉴) 图版 59: 9—12