

米。花期 8 月。

产台湾及华中等省区。生于山坡上。模式标本采自台湾外玉山。

24b. 川中剪股颖(变种)

var. *opienensis* Keng ex Y. C. Yang, 植物研究 4(4): 101. 1984.

与原变种的主要区别为花序长 15—20 厘米, 宽 3 厘米, 轮廓成长披针形。外稃长 1.5—1.7 毫米, 先端急尖, 芒着生在外稃背部 2/3—4/5 处; 内稃长仅 0.2 毫米。

产四川中部。生于海拔 2500—3000 米的路边、山坡上部、冷杉林迹地处。模式标本采自四川峨边县。

25. 普通剪股颖(拟)

*Agrostis canina* Linn. Sp. Pl. ed. 1. 62. 1753.

25a. 普通剪股颖(原变种)

var. *canina*

分布于亚洲的温带、欧洲和北美洲。我国不产。模式标本采自欧洲。

25b. 台湾剪股颖(变种) 图版 61: 9—11

var. *formosana* Hack. Bull. Herb. Boiss. 2. 4: 528. 1904. — *Agrostis sozanensis* Hayata, Ic. Pl. Formos. 7: 85. 1918; 禾本科图说 534. 图 461. 1959; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1297. 1936; 苏南植物手册 61. 图 90. 1959; 台湾禾草 247. 图 18. 1975; 中国高等植物图鉴 5: 110. 图 7050. 1976; 江苏植物志(上): 201. 图 337. 1977; 台湾植物志 5: 400. 1978. — *Agrostis sozanensis* var. *exaristata* Hand.-Mazz. l. c. 1297. 1936. — *Agrostis canina* Auct. non Linn.: Rendle in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 389. 1903—1905.

多年生草本, 具根状茎。秆丛生, 直立或基部稍倾斜上升, 高达 90 厘米, 直径 1—1.2 毫米, 具 3—5 节。叶鞘无毛, 上部叶鞘短于节间; 叶舌干膜质, 先端钝或平截, 长 2—6 毫米; 叶片线形, 长 7—20(30) 厘米, 宽 2—5 毫米, 扁平或先端内卷成锥状, 微粗糙。圆锥花序尖塔形或长圆形, 长 15—30 厘米, 宽 3—10 厘米, 疏松开展, 分枝多至 10 余枚, 少者 2—4 枚, 平展或上举, 下部有 1/2—2/3 裸露无小穗, 细弱, 微粗糙; 小穗柄长 1—3.5 毫米; 两颖近等长或第一颖稍长, 脊上微粗糙, 先端尖或渐尖; 外稃长 1.5—2 毫米, 先端钝或平截, 微具齿, 5 脉明显, 中部以下着生 1 芒, 芒长 0.8—2 毫米, 细直或微扭, 基盘两侧有长 0.2 毫米的短毛; 内稃长约 0.5 毫米; 花药线形, 长 1—1.2 毫米。花果期夏秋季。

产台湾、浙江、江苏、江西、安徽、湖南、四川诸省。生于海拔 1000—2000 米的潮湿、路边和山坡上。模式标本采自台湾。

本种外稃具很短的小芒, 小芒一般着生在外稃的近顶端。

26. 芒剪股颖(大兴安岭植物群落) 图版 61: 12—15

*Agrostis trinii* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 29. 1: 18. 1856; 禾本科图说 538. 图 463. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 110. 1976. — *Agrostis canina* Linn. subsp. *trinii*