

米,先端钝或平截,5脉明显,直达顶部,有的可伸出,稍显5齿,在近基部处着生膝曲之芒,芒长约3毫米,伸出于小穗之外,基盘微具毛;内稃小;花药黄色,线形,长1.2—1.6毫米。花期7—8月。

产辽宁、吉林的东部。生于海拔1500—2300米的林下或山坡上。分布于朝鲜、日本。模式标本采自日本。

29. 北疆剪股颖(拟)

Agrostis turkestanica Drob. Fl. Uzbekista et Schvenderi 1: 202. 1941. — *Agrostis vinealis* subsp. *turkestanica* (Drob.) Tzvel. Poac. URSS 336. 1976.

多年生草本,密丛生,具4—5枚分蘖枝。秆细瘦,高30—35厘米,直径约1毫米,基部微弧形弯曲,具2节,下面一节埋没在叶丛中,似仅具1节。叶鞘疏松抱茎,长过节间,表面光滑;叶在下部密集,上部几乎无叶;叶舌膜质,长圆形,先端圆,长2—3毫米;叶片短,长3—4厘米,基部叶扁平,上部叶内卷,宽0.5—1.5毫米。花序圆锥形,紧缩,长4—9厘米,宽0.5—1.5厘米,明显高出叶片;小穗暗紫色,穗梗平滑;颖片长2—2.2毫米,两颖近等长或第一颖长于第二颖(约长0.2毫米),披针形,先端急尖,第一颖的脊部具极短的粗毛;外稃长约1.9毫米,先端钝或近圆形,脉明显,芒在外稃背面的2/3至4/5处着生,长2.5—3毫米,直立;内稃长约0.2毫米;花药长1.2毫米。花果期8—9月。

产新疆北半部。生于海拔2300米的河谷和陆地上。模式标本采自中亚天山。

7. 单蕊草属*——*Cinna* Linn.

Linn. Sp. Pl. 1: 5. 1753.

多年生高大草本。圆锥花序开展。小穗含1小花,脱节于颖之下,小穗轴延伸于内稃之后如1短刺,,有时顶端着生1个不育的小花;颖相等长或近于等长,具1—3脉;外稃等长或稍短于颖,具3脉,顶端之下着生短芒;内稃稍短于外稃,两侧压扁,似具1脊;雄蕊1;子房长圆形,花柱基部联合。

模式种: *Cinna arundinacea* Linn. 产加拿大。

约有4种,分布于北半球之温带。我国有1种。

1. 单蕊草(禾本科图说) 图版 62: 7—8

Cinna latifolia (Trev.) Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. 4: 435. 1852; Roshev. in Komr. Fl. URSS 2: 169. 1934; Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 68. 1939; 禾本科图说 552. 图 480. 1959; 刘慎谔等, 东北植物检索表 490. 图版 180: 1. 1959; Tzvel. Poac. URSS 524. 1976; 中国高等植物图鉴 5: 113. 图 7055. 1976. — *Agrostis latifolia* Trev. in Goepf. Beschr. Bot.

* 单蕊草属(分科检索表附录),属名希腊字 *cinna* 是古代希腊1种草名。