

3. 甘青针茅(禾本科图说) 图版 65: 11—15

Stipa przewalskyi Roshev. in Not. Syst. Herb. Hort. Bot. Petrop. 1(6): 3. 1920; 禾本科图说 608. 图 548. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 121. 1976; 秦岭植物志 1(1): 148. 1976.

秆少数丛生, 高 30—80 厘米, 基部宿存枯萎的叶鞘。叶鞘基部者略长于而上部者短于节间; 基生叶舌钝圆, 长 0.5—1 毫米, 轮生者长 2—3 毫米, 两侧下延与叶鞘边缘结合; 叶片纵卷成线形, 下面微粗糙, 上面被微毛, 轮生者长 10—15 厘米, 基生者长达 30 厘米。圆锥花序长 15—30 厘米, 成熟时伸出鞘外, 分枝孪生, 上部着生少数小穗; 小穗灰绿色, 成熟后变紫色; 两颖几等长, 先端尖细呈尖尾状, 长 1.2—1.5 厘米, 第一颖具 3 脉, 第二颖具 5 脉, 外稃长 8—9 毫米, 具 5 脉, 顶端关节处生 1 圈短毛, 其下具微刺毛, 背部具排列成纵行的短毛, 基盘尖锐, 密生柔毛, 长约 2 毫米, 芒两回膝曲扭转, 角棱上具短刺毛, 第一芒柱长 1.5—2.5 厘米, 劲直; 内稃具 2 脉, 背面无毛或疏生短毛。花果期 5—8 月。

产内蒙古、宁夏、甘肃、西藏、青海、陕西、山西、河北、四川等省区。常生于海拔 850—3600 米的林缘、山坡草地或路旁。模式标本采自甘肃省。

草原或森林草原地区夏季草场主要牧草。

本种与丝颖针茅 (*Stipa capillacea*) 相近, 但秆生叶舌长 2—3 毫米; 小穗较短小; 花成熟常脱落仅留空颖; 芒较粗硬, 芒针短而劲直, 极易区别。

4. 狼针草(东北志油印本) 图版 65: 16—20

Stipa baicalensis Roshev. in Bull. Jard. Bot. Princ. URSS 28: 380. 1929; 禾本科图说 610. 图 551. 1959; 刘慎谔等, 东北植物检索表 494. 图版 182: 9. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 122. 图 7074. 1976.


秆直立丛生, 高 50—80 厘米, 具 3—4 节, 基部宿存枯萎的叶鞘。叶鞘平滑或糙涩, 下部者通常长于节间; 基生叶舌平截或 2 裂, 长 0.5—1 毫米, 轮生叶舌钝圆或 2 裂, 长 1.5—2 毫米, 均具睫毛; 叶片纵卷成线形, 基生叶长可达 40 厘米, 下面平滑, 上面具疏柔毛。圆锥花序基部常藏于叶鞘内, 长 20—50 厘米, 分枝细, 直立上举; 小穗灰绿色或紫褐色; 颖尖披针形, 先端细丝状, 长 2.5—3.5 毫米, 第一颖具 3 脉, 第二颖具 5 脉; 外稃长 11—14 毫米, 顶端关节处生 1 圈短毛, 背部具贴生成纵行的短毛, 基盘尖锐, 长约 4 毫米, 密生柔毛, 芒两回膝曲, 光亮无毛, 边缘微粗糙, 第一芒柱扭转, 长 3—5 厘米, 第二芒柱稍扭转, 长 1.5—2 厘米, 芒针长约 10 厘米; 内稃具 2 脉; 花药黄色, 长约 5 毫米。花果期 6—10 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、西藏、青海、陕西、山西、河北等省区。常生于海拔 700—4000 米的山坡和草地。苏联、蒙古有分布。模式标本采自苏联贝加尔。

幼嫩时为干草原、草甸草原地区, 牲畜喜食之牧草。

5. 针茅(禾本科图说): 图版 65: 21—25

Stipa capillata Linn. Sp. Pl. ed. 2. 116. 1762; Roshev. in Kom. Fl. URSS 2:



1—5.长芒草 *Stipa bungeana* Trin.: 1. 小穗, 2. 颖片, 3. 小花, 4—5. 叶舌。6—10.丝颖针茅
S. capillacea Keng: 6. 小穗, 7. 颖片, 8. 小花, 9—10. 叶舌。11—15. 甘青针茅 *S. przewalskyi* Roshev.:
 11. 小穗, 12. 颖片, 13. 小花, 14—15. 叶舌。16—20. 狼针草 *S. baicalensis* Roshev.: 16. 小穗, 17. 颖片,
 18. 小花, 19—20. 叶舌。21—25. 针茅 *S. capillata* Linn.: 21. 小穗, 22. 颖片, 23. 小花, 24—25. 叶舌。
 26—31. 大针茅 *S. grandis* P. Smirn.: 26. 小穗, 27—28. 颖片, 29. 小花, 30—31. 叶舌。32—36. 新
 疆针茅 *S. sareptana* Becker: 32. 小穗, 33. 颖片, 34. 小花, 35—36. 叶舌。37—41. 西北针茅
S. sareptana var. *krylovii* (Roshev.) P. C. Kuo et Y. H. Sun: 37. 小穗, 38. 颖片, 39. 小花,
 40—41. 叶舌。(宁汝莲绘)