

109. 1934; 禾本科图说 608. 图 549. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 122. 1976.

秆直立, 丛生, 高 40—80 厘米, 常具 4 节, 基部宿存枯叶鞘。叶鞘平滑或稍糙涩, 长于节间; 叶舌披针形, 基生者长 1—1.5 毫米, 秆生者长 4—8(10) 毫米; 叶片纵卷成线形, 上面被微毛, 下面粗糙, 基生叶长可达 40 厘米。圆锥花序狭窄, 几全部含藏于叶鞘内; 小穗草黄或灰白色; 颖尖披针形, 先端细丝状, 长 2.5—3.5 厘米, 第一颖具 1—3 脉, 第二颖具 3—5 脉(间脉多不明显); 外稃长 1—1.2 厘米, 背部具有排列成纵行的短毛, 芒两回膝曲, 光亮, 边缘微粗糙, 第一芒柱扭转, 长 4—5 厘米, 第二芒柱稍扭转, 长约 1.5 厘米, 芒针卷曲, 长约 10 厘米, 基盘尖锐, 长 2—3 毫米, 具淡黄色柔毛; 内稃具 2 脉。颖果纺锤形, 长 6—7 毫米, 腹沟甚浅。花果期 6—8 月。

产甘肃西部、新疆北部。多生于山间谷地、准平原面或石质性的向阳山坡。一般在海拔 500—2300 米。模式标本采自德国。

针茅的营养成分、适口性和耐牧性均很高, 是草原地带的优良饲用植物。

6. 大针茅(禾本科图说) 图版 65: 26—31

Stipa grandis P. Smirn. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 26: 267. 1929; Roshev. in Kom. Fl. URSS 2: 109. 1934; 禾本科图说 612. 图 552. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 122. 1976.

秆高 50—100 厘米, 具 3—4 节, 基部宿存枯萎叶鞘。叶鞘粗糙或老时变平滑, 下部者通常长于节间; 基生叶舌长 0.5—1 毫米, 钝圆, 缘具睫毛, 秆生者长 3—10 毫米, 披针形; 叶片纵卷似针状, 上面具微毛, 下面光滑, 基生叶长可达 50 厘米。圆锥花序基部包藏于叶鞘内, 长 20—50 厘米, 分枝细弱, 直立上举; 小穗淡绿色或紫色; 颖长 3—4.5 厘米, 尖披针形, 先端丝状, 第一颖具 3—4 脉, 第二颖具 5 脉; 外稃长 1.5—1.6 厘米, 具 5 脉, 顶端关节处生 1 圈短毛, 背部具贴生成纵行的短毛, 基盘尖锐, 具柔毛, 长约 4 毫米, 芒两回膝曲扭转, 微糙涩, 第一芒柱长 7—10 厘米, 第二芒柱长 2—2.5 厘米, 芒针卷曲, 长 11—18 厘米; 内稃与外稃等长, 具 2 脉; 花药长约 7 毫米。花果期 5—8 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、陕西、山西、河北。多生于广阔、平坦的波状高原上。模式标本采自蒙古。

大针茅是亚洲中部草原亚区最具代表性的建群植物之一, 大针茅草原是我国草原地带极为重要的一类天然草场, 不但适于放牧, 还是干草原地带的重要割草场。

7. 新疆针茅(拟)

Stipa sareptana Becker in Bull. Soc. Nat. Mosc. 57: 52. 1882; Roshev. in Kom. Fl. URSS 2: 111. 1934.

7a. 新疆针茅(原变种) 图版 65: 32—36

var. *sareptana*

秆高 30—80 厘米, 具 2—3 节, 被细刺毛。叶鞘平滑或具柔毛, 短于节间; 基生叶舌端